

トクホンダッシュエアロ

第三類医薬品
収れん・消炎薬（パップ剤を含む）

○6つの有効成分の作用で痛みにすぐれた効果を発揮。口液剤が広がらず患部に集中噴霧。口微香性だからシーンや場所を選ばず使える。パウダーインでさらっとした使用感。

効能・効果

筋肉疲労
関節痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・しもやけ

用法・用量

1日数回、患部に適量を噴霧してください。
小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、刺激が強く感じられることがあるため、7才未満の人への使用はさけてください。
目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。大量・広範囲には使用しないこと。
凍傷のおそれがあるため、患部から10cm以上離して噴霧するほか、同じ所に3秒以上連続して噴霧しないでください。
外用にのみ使用し、吸入しないでください。吸入によりめまい、はき気等の症状をおこすことがあるので、できるだけ吸入しないよう、また周囲の人にも十分注意してください。
パウダー入りですので、よく振ってから使用してください。

成分及び分量

有効成分 100mL中
l-メントール 2.1g
サリチル酸グリコール 1.5g
酢酸トコフェロール 0.3g
クロルフェニラミンマレイン酸塩 30mg
グリチルレチン酸 60mg
ニコチン酸ベンジルエステル 6mg

添加物

アルコール、タルク、メチルフェニルポリシロキサン、ジメチルエーテル、香料

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
● 次の部位には使用しないこと
目の周囲、粘膜等。
湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

● 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
● 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚：
発疹・発赤
かゆみ
かぶれ
はれ
痛み
● 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

直射日光を避け、涼しい所にキャップを閉めて、保管してください
小児の手のとどかない所に保管してください。
誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください
使用期限（缶底に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。
捨てる際は、下記の方法で残りのガスを抜いてください。

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。