第3類医薬品外用鎮痛消炎エアゾール剤

トクホンダッシュエアロ

- ○6つの有効成分の作用で痛みにすぐれた効果を発揮。
- ○液剤が広がらず患部に集中噴霧。
- ○微香性だからシーンや場所を選ばず使える。パウダーインでさらっとした使用感。

効能

筋肉疲労、筋肉痛、関節痛、打撲、捻挫、腰痛、肩こり、しもやけ

用法·用量

1日数回、患部に適量を噴霧してください。

注意

- ・ 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、刺激が強く感じられることがあるため、7 才未満の人への使用はさけてください。
- 顔に向けて噴霧しないでください。
- ・万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 大量・広範囲には使用しないでください。
- ・ 外用にのみ使用し、吸入しないでください。吸入によりめまい、吐き気等の症状を起こすことがあるので、できるだけ吸入しないよう、また周囲の人にも 十分注意して使用してください。
- ・パウダー入りですので、よく振ってから使用してください。
- ・ 凍傷のおそれがあるため、 患部から 10cm 以上離して噴霧するほか、同じ箇所に 3 秒以上連続して噴霧しないでください。

成分

有効成分 100mL 中

ℓ-メントール 2.1g

サリチル酸グリコール 1.5g

ビタミン E 酢酸エステル 0.3g

ニコチン酸ベンジルエステル 6mg

クロルフェニラミンマレイン酸塩 30mg

グリチルレチン酸 60mg

添加物

アルコール、タルク、DME、香料

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

●次の部位には使用しないでください

目の周囲、粘膜等。

湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

●次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

●使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に 相談してください

皮膚:発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み

●5~6 日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

- ・直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 火気に近づけないでください。
- ・小児の手の届かない所に保管してください。
- ・他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- ・使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(品質保持のため)

2022/06/13 1 / 2ページ

・捨てる際は、下記の方法で残りのガスを抜いてください。

ガス抜きの注意事項と方法

(ガス抜きキャップ付き)

- ※中身を使い切ってから、火気のない屋外で行ってください。
- ※ガス抜き中は、わずかに残った薬液がガスと共に噴き出しますので、顔を近づけないでください。
- ※本品のキャップ以外は、使用しないでください。
- ①押しボタンを引き抜きます。
- ②キャップの上部をはずし、平らな所に伏せて置きます。
- ③キャップの天面中央の穴に本体を逆さまにして押し込み、噴射音が消えるまで放置します。
- ④噴射音が完全に消えてから、市町村等で定められた方法により廃棄してください。

火気と高温に注意

内容量 200mL

41

【多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者(又は当社)による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者(又は当社)は一切の責任を負いかねます。

2022/06/13 2 / 2ページ