

トクホン

第三類医薬品
収れん・消炎薬（パップ剤を含む）

トクホンは、炎症を抑え痛みをやわらげるサリチル酸メチル、血行をよくするビタミンE、皮膚の炎症を抑えるグリチルレチン酸を配合して、肌にやさしく、筋肉の炎症と痛みを抑えるのに適した貼り薬です。四スミを丸くして、使用中はがれにくくしています。

効能・効果

筋肉疲労
関節痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・しもやけ

用法・用量

薬剤面をおおったはく離紙をはがし、1日数回患部に貼付してください。
小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、刺激が強く感じられることがあるため、7才未満の人への使用はさけてください。
患部を清潔にしてから使用してください。
皮膚の弱い人は同じ所に続けて使用しないでください。
使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状がおきないことを確かめてから使用してください。

成分及び分量

有効成分 膏体100g(0.54m²)中
L-メントール 6.5g
dl-カンフル 1.1g
サリチル酸メチル 7.3g
酢酸トコフェロール 1.35g
グリチルレチン酸 0.18g

添加物

酸化亜鉛,ジブチルヒドロキシルエン(BHT),生ゴム,ポリイソブレン,エステルガム,その他2成分

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
● 次の部位には使用しないこと
目の周囲、粘膜等。
湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

● 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
使用后、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
● 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

直射日光を避け、涼しい所に保管してください
小児の手のとどかない所に保管してください。
開封後、早めに使用して下さい
誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください
使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

31

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- 本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- 多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- 多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- 多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。