

TOKUHON E

TOKUHON E 是配合了抑制炎症缓解疼痛的乙二醇水杨酸酯、l-薄荷醇、改善血液循环的维生素 E 的微香型外用镇痛抗炎贴剂。本剂对皮肤温和刺激感小，四角做成圆角，使用过程中不易脱落，且呈肤色，不透色不显眼。贴着也不会引起周围人的注意。

效能或效果

肩膀酸痛、腰痛、肌肉疼痛、肌肉疲劳、关节痛、撞伤、挫伤、冻疮

用法及用量

请揭下覆盖于药剂表面的剥落纸，1 天数次粘贴于患处。

注意

- 儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。此外，可能会有很强的刺激效果，因此请不要让未满 7 岁的人群使用。
- 请先清洗患处再使用。
- 皮肤较弱的人群请勿连续用于同一部位。
- 在使用前取小片贴在上臂内侧皮肤较弱的部位，确认没有起疹发红、发痒、斑疹等症状后使用。

成分及分量

有效成分 1 平方米中

l-薄荷醇 11.5g

维生素 E 醋酸酯 2.5g

乙二醇水杨酸酯 3.0g

添加剂

氧化锌，二丁基羟基甲苯，生橡胶，松香甘油酯，其他成分 1

使用注意事项

禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用)

- 不要用于下述部位
眼睛周围、粘膜等
湿疹、斑疹、伤口

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
因药物等出现过过敏症状的人群
- 使用后皮肤出现起疹发红、发痒、斑疹等症状时有可能是副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
- 即使使用 5~6 天仍不见症状好转时，请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 开封后，请将袋子的开口折好进行保管，并尽早使用。
- 为了避免误用，并保证质量，请不要移至其他容器中。
- 请勿使用超过使用期限的产品。

51

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。