

Tokuhon E 痠痛貼布為含有抑制發炎、舒緩疼痛的glycol salicylate、l-Menthol與促進血液循環的維生素E配方的微香型鎮痛消炎外用貼布。經醇素處理，將天然橡膠（基劑成分）所含微量皮膚刺激成分去除，因此溫和肌膚，不易造成出疹。貼布藥劑採四角圓角設計，使用時不易脫落。膚色貼布不透色，不顯眼。

療效或效果

肌肉疲勞
關節痛、腰痛、肌肉疼痛、肩膀痠痛、撞傷痛、骨折痛、扭傷痛、凍瘡口

用法及用量

請撕下覆蓋於藥劑表面的離型紙，1天數次貼於患處。
兒童使用時，請於家長的指導監督下使用。此外，刺激感可能較強，因此未滿7歲的兒童不宜使用。
請清潔患部後再行使用。
皮膚敏感脆弱者，請避免持續使用於同一部位。
使用前建議於手臂內側皮膚敏感處黏貼小片貼布，確認並未出現出疹、發紅、搔癢、斑疹等症狀後再行使用。

成分及分量

有効成分 1 平方米中
l-Menthol 11.5g
Tocopherol acetate 2.5g
Glycol Salicylate 3g

添加劑

Zinc oxide, Butylated hydroxytoluene, Raw rubber, Ester gum, Other one-component

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）
請勿用於下列部位。
眼睛周圍、黏膜等。
濕疹、斑疹、傷口。

諮詢事項

- 下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
使用後皮膚出現出疹、泛紅、發癢、斑疹等症狀時
有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
- 即使使用5~6天，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射的陰涼處保管
請置於兒童無法觸及之處保管。
開封後，請將袋口反折保管並儘早使用完畢
為避免誤用並確保品質，請勿換裝於所附保存袋以外的容器
請勿服用超過使用期限的產品。

31

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。