

# TOKUHON E

Tokuhon E 痠痛貼布為含有抑制發炎、舒緩疼痛的 glycol salicylate、l-Menthol 與促進血液循環的維生素 E 配方的微香型鎮痛消炎外用貼布。貼布對肌膚溫和無負擔，並採四角圓角設計，使用時不易脫落。膚色貼布不透色，不顯眼，不易被周圍察覺。

## 療效或效果

肩膀酸痛、腰痛、肌肉疼痛、肌肉疲勞、關節痛、撞傷、扭傷、凍瘡

## 用法及用量

請撕下覆蓋於藥劑表面的離型紙，1 天數次貼於患處。

### 注意事項

- 兒童使用時，請於家長的指導監督下使用。此外，刺激感可能較強，因此未滿 7 歲的兒童不宜使用。
- 請清潔患部後再行使用。
- 皮膚敏感脆弱者，請避免持續使用於同一部位。
- 使用前建議於手臂內側皮膚敏感處黏貼小片貼布，確認並未出現出疹、發紅、搔癢、斑疹等症狀後再行使用。

## 成分及分量

有効成分 1 平方米中

l-薄荷腦 11.5g

維生素 E 醋酸酯 2.5g

乙二醇水楊酸酯 3.0g

### 添加劑

氧化鋅，二丁基羥基甲苯，生膠，松香甘油酯，其他成分 1

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

- 請勿使用於下列部位

眼睛周圍、黏膜等

濕疹、斑疹、傷口

### 諮詢事項

- 下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
曾因藥品等，引發過敏症狀的人
- 使用後皮膚出現起疹、泛紅、發癢、斑疹等症狀時有可能是副作用，應立刻停止使用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
- 使用 5 ~ 6 天症狀仍未見改善時，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

- 請置於避免日光直射的陰涼處保管。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 開封後，請將袋口反折保管並儘早使用完畢。
- 為避免誤用並確保品質，請勿換裝於其他容器。
- 請勿使用超過使用期限的產品。

51

### 【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。