

- SIS기제 채택으로 인해 신속하게 피부로부터 흡수된 Glycol salicylate가 L-Menthol의 상쾌한 자극감과 동시에 뛰어난 진통소염 효과를 높여줍니다.
- 
- Vitamin E가 혈액순환을 개선해주고 효과를 높여줍니다. □피부에 순한 부드러운 기제와 신속성 있는 기포를 채택하여 네 귀퉁이 부분을 동글게 쳐

## 효능 또는 효과

근육피로  
관절통·요통·근육통·어깨 결림통·타박통·골절통·염좌통·동상□

## 용법 및 용량

약제면을 덮은 바리지를 벗겨내고, 1일 수 차례 환부에 붙이십시오.  
소아에게 사용하게 할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 사용하도록 하십시오. 또한, 자극이 강하게 느껴질 수 있기 때문에 7세 미만의 사람에게 사용하는 것은 피하십시오.  
환부를 청결히 한 후에 사용하십시오.  
피부가 약한 사람은 같은 곳에 계속해서 사용하지 마십시오.  
사용하기 전에 팔 안쪽 피부가 약한 부분에 작은 조각을 붙여 발진·발적, 가려움, 접촉성 피부염 등의 증상이 발생하지 않는 것을 확인한 후 사용하십시오.

## 성분 및 분량

Active ingredients in 100 g (0.464 m2) of ointment  
l-Menthol 4.9g  
dl-Camphor 0.9g  
Glycol Salicylate 1.4g  
Tocopherol acetate 2g

## 첨가물

Titanium oxide, Butylated hydroxytoluene, Styrene-isoprene-styrene block copolymer, Thymol, Silicon dioxide, Polyisobutylene, Liquid paraffin, Ester gum, Other one-component

## 사용상의 주의

### 해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용을 일으키기 쉽다)  
다음 부위에는 사용하지 마십시오.  
눈 주위, 점막 등.  
습진, 접촉성 피부염, 상처.

### 상담할 내용

- 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것  
약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.  
사용 후, 피부에 발진·발적, 가려움, 접촉성 피부염 등의 증상이 나타난 경우는  
부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.
- 5~6일 동안 사용해도 증상이 나아지지 않으면 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

## 보관 및 취급상의 주의

직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하십시오.  
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.  
개봉 후, 봉투의 입구를 접어서 보관하고 빨리 사용하십시오.  
사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

31

### 【OTC 의약품의 다언어 제품 정보에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가변역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다..