

TOKUHON ACE HOT

第三类医药品
镇痛、镇痒、收敛、消炎药（包
括巴布剂）

○通过采用SIS主剂，glycol salicylate会迅速渗透患处，对严重的痛感发挥显著的效果。□Nonanoic acid vanillylamide的温和刺激和维生素E的作用会改善血液循环，缓解顽固的酸痛症状。□采用了温和型主剂和带伸缩性的基布，在关节部位也会紧紧贴住。□本药剂为淡香性气味、且不显眼的粉底颜色。

效能或效果

肌肉疲劳
关节痛、腰痛、肌肉痛、肩部酸痛、跌打痛、骨折疼痛、挫伤疼痛、冻疮□

用法及用量

请揭下覆盖药剂面的剥落纸，1天数次粘贴于患处。
儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。此外，可能会有很强的刺激效果，因此请不要让未满13岁的人群使用。
请先清洗患处再使用。
皮肤较弱的人群请勿连续用于同一部位。
在使用前取小片贴在上臂内侧皮肤较弱的部位，确认没有起疹发红、发痒、斑疹、痛感等症状后使用。
请在洗澡前1小时之前撕下。撕下后马上洗澡会有强烈的刺激效果。
正在粘贴的患处不要使用电暖桌或电热毯等进行保暖。

成分及分量

有効成分 膏体100 g (0.455平方米) 中
l-Menthol 1g
Glycol Salicylate 2g
Nonanoic acid vanillylamide 0.013g
Tocopherol acetate 0.8g

添加剂

Titanium oxide, Butylated hydroxytoluene, Styrene-isoprene-styrene block copolymer, Silicon dioxide, Polyisobutylene, Macrogol, Liquid paraffin, Ester gum, Other one-component

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）
●下述人群不要使用
眼睛周围、粘膜等。
湿疹、斑疹、伤口

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
因药物等出现过过敏症状的人群
使用后皮肤出现起疹发红、发痒、斑疹等症状时
则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
●若使用5~6天后症状仍无改善则应中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射的阴凉场所
请保管在儿童无法触及的地方。
开封后，请将袋子的开口折好进行保管，并尽早使用
避免误用，并保证质量，请不要移至其他容器中
请勿使用超过使用期限的产品。

31

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任