

○採用SIS基劑而有助glycol salicylate迅速滲透患部，針對惱人疼痛發揮優異效果。□Nonanoic acid vanillylamide的溫熱感受與維生素E作用改善血液循環，舒緩難以消解的僵硬不適。□採用柔軟基劑與伸縮性布料，關節部位亦可緊密貼合。□微香性，不顯眼的膚色貼布。

## 療效或效果

肌肉疲勞

關節痛、腰痛、肌肉疼痛、肩膀痠痛、撞傷痛、骨折痛、扭傷痛、凍瘡□

## 用法及用量

請撕下覆蓋於藥劑表面的離型紙，1天數次貼於患處。

兒童使用時，請於家長的指導監督下使用。此外，刺激感可能較強，因此未滿13歲的兒童不宜使用。

請清潔患部後再行使用。

皮膚敏感脆弱者，請避免持續使用於同一部位。

使用前建議於手臂內側皮膚敏感處黏貼小片貼布，確認並未出現出疹、發紅、搔癢、斑疹、疼痛等症狀後再行使用。

請於入浴前1小時將貼布撕除。撕除後馬上入浴可能造成強烈刺激感。

請勿以暖被桌或電毯等溫熱貼有貼布的患部。

## 成分及分量

有効成分 膏狀物100g (0.455 平方米)中

I-Menthol 1g

Glycol Salicylate 2g

Nonanoic acid vanillylamide 0.013g

Tocopherol acetate 0.8g

## 添加劑

Titanium oxide, Butylated hydroxytoluene, Styrene-isoprene-styrene block copolymer, Silicon dioxide, Polyisobutylene, Macrogol, Liquid paraffin, Ester gum, Other one-component

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

●下列的人請勿使用

眼睛周圍、黏膜等。

濕疹、斑疹、傷口。

### 諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

使用後皮膚出現出疹、泛紅、發癢、斑疹等症狀時

有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

●即使使用5~6天，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射的陰涼處保管

請置於兒童無法觸及之處保管。

開封後，請將袋口反折保管並儘早使用完畢

為避免誤用並確保品質，請勿換裝於其他容器

請勿使用超過使用期限的產品。

### 【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责事项】

·本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。

·多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。

·多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。

·关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。