

TOKUHON Aroma S

效能

肩膀酸痛, 肌肉疲劳, 肌肉疼痛, 腰痛, 撞伤, 挫伤, 关节痛, 冻疮, 骨折疼痛

用法及用量

请揭下覆盖药剂面的薄膜, 1 天数次粘贴于患处。

注意

- 儿童使用时, 请在监护人的指导监督下使用。此外, 可能会有很强的刺激效果, 因此请不要让未满 7 岁的人群使用。
- 请先清洗患处再使用。
- 皮肤较弱的人群请勿连续用于同一部位。
- 在使用前取小片贴在上臂内侧皮肤较弱的部位, 确认没有起疹发红、发痒、斑疹等症状后使用。

成分

膏体 100g (0.625m²) 中

乙二醇水杨酸酯 5.0g

l-薄荷醇 1.5g

维生素 E 醋酸酯 2.0g

甘草次酸 0.18g

添加剂

苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物, 聚异丁烯, 液体石蜡, 松香甘油酯, 二丁基羟基甲苯, 香料, 苯乙醇, 其他成分 1

使用注意事项

禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化, 或容易出现副作用)

- 请不要用于下述部位
眼睛周围、粘膜等。
湿疹、斑疹、伤口。

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
因药物等出现过过敏症状的人群。
- 使用中或使用后皮肤出现起疹发红、发痒、斑疹等症状时有可能是副作用, 此时应立即中止使用, 并携带本包装袋咨询医师、药剂师或登录贩卖者
- 若使用 5 ~ 6 天后症状仍无改善则应中止使用, 并携带本包装袋咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 开封后请将未使用的药品放入原来的包装袋中, 并将袋口好好折叠后进行保管。(为了保证质量)
- 请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质。)
- 请勿使用超过使用期限的产品。且, 即使在使用期限内, 开封后请尽快使用。

11

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的, 基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译, 仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商 (或本公司) 的暂时翻译, 今后有可能会被修改或变更, 恕不另行通知。
- 供应商 (或本公司) 对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。