

# トクホン Aroma S

## 効能

肩こり、筋肉疲労、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、関節痛、しもやけ、骨折痛

## 用法・用量

薬剤面をおおったフィルムをはがし、1日数回患部に貼付してください。

### 注意

- ・ 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、刺激が強く感じられることがあるため、7才未満の人への使用はさけてください。
- ・ 患部を清潔にしてから使用してください。
- ・ 皮膚の弱い人は同じ所に続けて使用しないでください。
- ・ 使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状が起きないことを確かめてから使用してください。

## 成分

膏体 100g (0.625m<sup>2</sup>) 中

サリチル酸グリコール 5.0g

I-メントール 1.5g

ビタミン E 酢酸エステル 2.0g

グリチルレチン酸 0.18g

### 添加物

スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、流動パラфин、エステルガム、ジブチルヒドロキシトルエン、香料、フェニルエチルアルコール、その他 1 成分

## 使用上の注意

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の部位には使用しないでください

目の周囲、粘膜等。

湿疹、かぶれ、傷口。

### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

- 使用中又は使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 保管及び取扱い上の注意

- ・直射日光の当たらない、涼しい所に保管してください。
- ・小児の手の届かない所に保管してください。
- ・開封後は未使用分はもとの袋に入れ、袋の開封口をきちんと折り曲げて保管してください。（品質保持のため）
- ・他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- ・使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。

11

### 【多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。