

TOKUHON Aroma S

효능

어깨 결림, 근육피로, 근육통, 요통, 타박상, 염좌, 관절통, 동상, 골절통

용법 및 용량

약제면을 덮은 필름을 벗겨내고, 1 일 수 차례 환부에 붙이십시오.

주의

- 소아에게 사용하게 할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 사용하도록 하십시오. 또한, 자극이 강하게 느껴질 수 있기 때문에 7 세 미만의 사람에게 사용하는 것은 피하십시오.
- 환부를 청결히 한 후에 사용하십시오.
- 피부가 약한 사람은 같은 곳에 계속해서 사용하지 마십시오.
- 사용하기 전에 팔 안쪽 피부가 약한 부분에 작은 조각을 붙여 발진 · 발적, 가려움, 접촉성 피부염 등의 증상이 발생하지 않는 것을 확인한 후 사용하십시오.

성분

In 100g (0.625m²) of ointment

살리실산글리콜 5.0g

I-멘톨 1.5g

토코페롤아세테이트 2.0g

글리시리진산 0.18g

첨가물

스티렌-이소프렌-스틸렌블록 공중합체, 폴리이소부틸렌, 유동파라핀, 에스테르검, 디부틸히드록시톨루엔, 향료, 페닐에틸알코올, 기타 1 성분

사용상의 주의

해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용을 일으키기 쉽다)

- 다음 부위에는 사용하지 마십시오.

눈 주위, 점막 등.

습진, 접촉성 피부염, 상처.

상담할 내용

- 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

- 사용 중 또는 사용 후, 피부에 발진 · 발적, 가려움, 접촉성 피부염 등의 증상이 나타난 경우는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중단한 후, 이 봉지를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

- 5~6 일 동안 사용해도 증상이 나아지지 않으면 사용을 중단한 후, 이 봉지를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 개봉 후 미사용분은 원래 봉지에 넣어 개봉부를 단단히 접어 보관하십시오.(품질 유지를 위함)
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)
- 사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오. 또한, 사용기한을 초과하지 않아도 일단 개봉한 후에는 가급적 빨리 사용하십시오.

11

【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.

- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가변역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.