

TOKUHON Clear

療效

肩膀酸痛, 肌肉疲勞, 肌肉疼痛, 腰痛, 撞傷, 扭傷, 關節痛, 凍瘡, 骨折疼痛

用法及用量

請撕下覆蓋於藥劑表面的薄膜, 1 天數次貼於患處。

注意事項

- 兒童使用時, 請於家長的指導監督下使用。此外, 刺激感可能較強, 因此未滿 7 歲的兒童不宜使用。
- 請清潔患部後再行使用。
- 皮膚敏感脆弱者, 請避免持續使用於同一部位。
- 使用前建議於手臂內側皮膚敏感處黏貼小片貼布, 確認並未出現出疹、發紅、搔癢、斑疹等症狀後再行使用。

成分

膏狀物 100g (0.625m²) 中

乙二醇水楊酸酯 5.0g

l-薄荷腦 1.5g

維生素 E 醋酸酯 2.0g

甘草次酸 0.18g

添加劑

苯乙烯-異戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物, 聚異丁烯, 液體石蠟, 松香甘油酯, 二丁基羥基甲苯, 其他成分 1

使用上的注意事項

禁止事項

(若不遵守, 現在的症狀會惡化, 或者容易引發副作用)

- 請勿用於下列部位

眼睛周圍、黏膜等。

濕疹、斑疹、傷口。

諮詢事項

- 下列的人於使用前, 請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
曾因藥品等, 引發過敏症狀的人。
- 使用中或使用後皮膚出現起疹、泛紅、發癢、斑疹等症狀時有可能是副作用, 請立刻停止使用, 攜帶此包裝袋, 諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
- 即使使用 5~6 天, 症狀也沒有改善的情況下, 請停止使用, 攜帶此包裝袋, 諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- 請置於避免日光直射的陰涼處保管。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 開封後未使用部分請放回原有包裝袋並將袋口折疊存放。(以確保產品品質)
- 請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- 請勿使用超過使用期限的產品。此外, 即使於使用期限內, 產品一經開封, 請儘早使用完畢。

11

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下, 獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯, 僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商(或我們)的臨時翻譯, 如有改動或更改, 恕不另行通知。
- 供應商(或我們)對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。