

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	トクホンLoxyテープ トクホンLoxyテープL
2	成分・分量	膏体 100g 中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 5.67g(無水物として 5g) L-メントール 1.6g トコフェロール酢酸エステル 2.3g
3	用法・用量	プラスチックフィルムをはがし、1日1回患部に貼ってください。 [注意] ・トクホンLoxyテープ：1日あたり4枚を超えて使用しないでください。 ・トクホンLoxyテープL：1日あたり2枚を超えて使用しないでください。
4	効能・効果	肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は使用しないでください <ol style="list-style-type: none"> 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 <u>本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。</u> 15才未満の小児。 次の部位には使用しないでください <ol style="list-style-type: none"> 目の周囲、粘膜等。 湿疹、かぶれ、傷口。 みずむし・たむし等又は化膿している患部。 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください 連続して2週間以上使用しないでください (本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください) 次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"> 医師の治療を受けている人。 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 <u>妊婦又は妊娠していると思われる人。</u> 高齢者。 次の診断を受けた人。 気管支ぜんそく
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

[注意事項]

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。