

ヴィックス ヴェポラップ

指定医薬部外品
鼻づまり改善（指定医薬部外品）

ヴィックス ヴェポラップは、胸・のど・背中にぬることで、鼻づまり、くしゃみなど、かぜに伴う諸症状を緩和します。

効能・効果

鼻づまり、くしゃみ等のかぜに伴う諸症状の緩和

用法・用量

次の量を胸・のど・背中に塗布、又は塗布後布で覆ってください。（3gは、ティースプーン1杯が目安です）

12才以上、1回6～10g、1日3回

6～11才、1回5g、1日3回

3～5才、1回4g、1日3回

6ヵ月～2才、1回3g、1日3回

6ヵ月未満、使用しないこと

定められた用法・用量を厳守してください。

小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分及び分量

100g中

dl-カンフル 5.26g

テレピン油 4.68g

l-メントール 2.82g

ユーカリ油 1.33g

ニクズク油 0.69g

杉葉油 0.44g

添加物

チモール,ワセリン

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

● 次の部位には使用しないこと

目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、傷口）等。

相談すること

次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

医師の治療を受けている人。

妊婦又は妊娠していると思われる人。

本人又は家族がアレルギー体質の人

湿潤やただれのひどい人。

薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

熱がある人又は症状が長引いている人。

次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

使用后、次の症状があらわれた場合。

皮膚：

発疹・発赤

かゆみ

7日間使用しても症状がよくなる場合

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

小児の手のとどかない所に保管してください。

他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。（品質保持のため）

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。