

VICKS MEDICAL TROCHE

- ◆VICKS MEDICAL TROCHE 是配合了具有杀菌消毒作用的氯化十六烷基吡啶、具有镇咳作用的消旋盐酸甲基麻黄碱、帮助祛痰的愈创木酚磺酸钾的镇咳祛痰剂。
- ◆对因咽喉炎症引起的咽喉疼痛、咽喉不适、咳嗽等症状发挥出色效果。
- ◆为服用方便的抹茶味含片。

效能

咳嗽、伴随喘鸣（嗤嗤、呼呼）的咳嗽、痰、因喉咙炎症导致声音嘶哑、咽喉的干涩红肿、咽喉不适感、咽喉疼痛、咽喉肿胀

用法及用量

请间隔 2 个小时以上，按以下用量含在口中，不要咀嚼，慢慢溶解。

8 岁以上，1 次 1 片，1 天 6 次

未满 8 岁，请勿服用

注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。
- 请勿咀嚼或吞咽。

药片的取用方法

指尖用力按下装有药片的 PTP 板的凸出部，弄破背面的铝箔再取出服用。（以包装的状态直接误吞，会发生穿破食管粘膜等意外事故）

成分

1 片中

氯化十六烷基吡啶 1mg

消旋盐酸甲基麻黄碱 6.25mg

愈创木酚磺酸钾 22.5mg

添加剂

玉米淀粉，二氧化硅，羟丙基纤维素，还原麦芽糖水饴，硬脂酸镁，L-薄荷醇，乙酰磺胺酸钾，三氯蔗糖，阿斯巴甜（L-苯丙氨酸化合物），三氧化二铁，食用蓝色 1 号，香料，香兰素，苯酚

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

- 在服用本药剂期间，不要使用下述任何医药品
其他镇咳祛痰药、感冒药、镇静药

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师治疗的人群。
孕妇或有其可能性的人群。
哺乳期人群。
老年人。
因药物等出现过过敏症状的人群。
拥有以下症状的人群。
高烧
接受以下诊断的人群。
心脏病，高血压，糖尿病，甲状腺功能障碍
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
皮肤：起疹、发红、发痒
消化系统：恶心、呕吐、食欲不振
精神神经系统：头晕
- 若服用 5~6 次后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质)
- 请勿服用超过使用期限的产品。此外, 即使在使用期限内, 开封后请在 6 个月以内服用。(为了保证质量)

11

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的, 基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译, 仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商 (或本公司) 的暂时翻译, 今后有可能会被修改或变更, 恕不另行通知。
- 供应商 (或本公司) 对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。