

VICKS メディカル トローチ

- ◆ ヴィックス メディカル トローチは、殺菌・消毒作用のあるセチルピリジニウム塩化物水和物、せきを鎮める dl-メチルエフェドリン塩酸塩、たんを出しやすくするグアヤコールスルホン酸カリウムを配合した鎮咳去痰薬です。
- ◆ のどの炎症によるのどの痛みやのどのイガイガ、せきなどの症状に優れた効果を発揮します。
- ◆ 服用しやすい、抹茶風味のトローチ剤です。

効能

せき、喘鳴（ぜーぜー、ひゅーひゅー）をともなうせき、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

用法・用量

次の量を2時間以上の間隔をおいて、口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

8才以上、1回1錠、1日6回

8才未満、服用しないこと

注意

- ・ 定められた用法・用量を厳守してください。
- ・ 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- ・ かみくだいたり、のみこんだりしないでください。

錠剤の取り出し方

錠剤の入っている PTP シートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

成分

1錠中

セチルピリジニウム塩化物水和物 1mg

dl-メチルエフェドリン塩酸塩 6.25mg

グアヤコールスルホン酸カリウム 22.5mg

添加物

トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、還元麦芽糖水アメ、ステアリン酸 Mg、l-メントール、アセスルファム K、スクラロース、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、三酸化鉄、青色1号、香料、バニリン、フェノール

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
医師の治療を受けている人。
妊婦又は妊娠していると思われる人。
授乳中の人。
高齢者。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
次の症状のある人。
高熱
次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹・発赤、かゆみ
消化器：吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系：めまい
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

- ・ 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ・ 小児の手の届かない所に保管してください。
- ・ 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- ・ 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。（品質保持のため）

11

【多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・ 本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・ 多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・ 多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・ 多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。