

VICKS MEDICAL TROCHE

- ◆VICKS MEDICAL TROCHE 為含有具殺菌消毒作用的十六烷基氯化吡啶、鎮咳作用的鹽酸消旋甲基麻黃鹼、有助祛痰的愈創木酚磺酸鉀配方的鎮咳祛痰藥。
- ◆對喉嚨發炎所造成的喉嚨疼痛、喉嚨不適以及咳嗽等症狀發揮出色效果。
- ◆易於服用的抹茶風味口含錠。

療效

咳嗽、伴隨喘鳴聲（呼呼聲、咻咻聲）的咳嗽、生痰、因喉嚨發炎而聲音沙啞、喉嚨不舒服、喉嚨不適感、喉嚨痛、喉嚨腫

用法及用量

每次間隔 2 小時以上，含服以下用量於口中，不嚼碎待其徐徐溶化。

8 歲以上，1 次 1 錠，1 天 6 次

未滿 8 歲者，請勿服用

注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。
- 請勿嚼碎、吞食。

錠劑取出方法

以指尖用力按壓藥錠 PTP 包裝凸出部位，使鋁箔背模破裂後取出藥錠服用。（不慎誤食包裝將可能造成刺傷食道黏膜等意外事故發生）

成分

1 錠中

十六烷基氯化吡啶 1mg

鹽酸消旋甲基麻黃鹼 6.25mg

愈創木酚磺酸鉀 22.5mg

添加劑

玉米澱粉，二氧化矽，羥丙基纖維素，還原麥芽糖漿，硬脂酸鎂，l-薄荷腦，醋磺內酯鉀，三氯蔗糖，阿斯巴甜(L-苯丙氨酸化合物)，氧化鐵，食用藍色 1 號，香料，香蘭素，苯酚

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

- 服用本藥劑的期間，請勿使用下列任何一種醫藥品

其他鎮咳祛痰藥、感冒藥、鎮靜藥

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

正在哺乳的人。

年長者。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

有下列症狀的人。

發高燒

接受過下列診斷的人。

心臟病，高血壓，糖尿病，甲狀腺功能障礙

- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：出疹、發紅、搔癢

消化器官：噁心、嘔吐、食慾不振

精神神經系統：暈眩

- 即使服用 5~6 次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- 請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- 請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於 6 個月內服用完畢。(為確保品質)

11

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。