

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

のどの炎症による のどの痛み・イガイガ、せきに

# VICKS メディカル トローチ L

販売名: ヴィックス メディカル トローチ L 第2類医薬品 (鎮咳去痰薬)

- ◆ ヴィックス メディカル トローチ L は、殺菌・消毒作用のあるセチルピリジニウム塩化物水和物、せきを鎮めるフェノールフタリン酸デキストロメトルファン、たんを出しやすくするグアヤコールスルホン酸カリウムを配合した鎮咳去痰薬です。
- ◆ のどの炎症によるのどの痛みやのどのイガイガ、せきなどの症状に優れた効果を発揮します。
- ◆ 服用しやすい、はちみつレモン風味のトローチ剤です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故\*が起こりやすくなります)

- 1 次の人は服用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬
- 3 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります)\*



## 相談すること



- 1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) 次の症状のある人。  
高熱
- 2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ


まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 3 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
眠気\*
- 4 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効 能

せき、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ



## 用法・用量

次の量を2時間以上の間隔をおいて、口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

年 令	1回量	服用回数
8才以上	1錠	1日6回
8才未満	服用しないこと	

### 【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)かみくだいたり、のみこんだりしないでください。
- (4)錠剤の取り出し方  
図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



## 成 分

1錠中

成 分	分 量	はたらき
セチルピリジニウム塩化物水和物	1 mg	のどを殺菌・消毒します。
フェノールフタリン酸デキストロメトルフアン	7.5mg	せき中枢にはたらい、つらいせきを鎮めます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	22.5mg	のどにからんだたんをやわらかくして出しやすくします。

添加物：トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、還元麦芽糖水アメ、ステアリン酸Mg、l-メントール、アセスルファミンK、レモン油、スクラロース、クエン酸、ビタミンB<sub>2</sub>、香料

### 【注意】

錠剤により添加物のビタミンB<sub>2</sub>による赤い斑点がみられることがありますが、効果には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

**連絡先** 大正製薬株式会社 お客様119番室

**電 話** 03-3985-1800

**受付時間** 8:30~17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間は、大正製薬ホームページにてご確認ください



**大正製薬株式会社**

東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<https://brand.taisho.co.jp/vicks/>

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)