

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	ヴィックス メディカル トローチL
2	成分・分量	1錠中 セチルピリジニウム塩化物水和物 1mg フェノールフタリン酸デキストロメトルファン 7.5mg グアヤコールスルホン酸カリウム 22.5mg
3	用法・用量	次の量を1日6回、2時間以上の間隔をおいて、口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。 8才以上 1回1錠 8才未満 服用しないこと
4	効能・効果	せき、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのほれ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	- 次の人は服用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬 - 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります) - 次に該当する人はお申し出ください - 医師の治療を受けている人。 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 - 次の症状のある人。 高熱 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。