

療效或效果

因喉嚨發炎的聲音沙啞、喉嚨不舒服、喉嚨不適感、喉嚨痛、喉嚨腫
口腔內的殺菌・消毒、去除口臭

用法及用量

請按照年齡將以下份量於口中逐個含服，請勿咀嚼讓其慢慢溶解
成人(15歲以上)，1天3個，1天4~6次
5~14歲，1次2個，1天4~6次
未滿5歲者，請勿使用
※使用時請逐個含服。請勿1次使用3個(15歲以上)，或2個(5~14歲)
請務必遵守規定用法、用量。
使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。
請勿嚼碎、吞食。

成分及分量

18粒中
Cetylpyridinium chloride 8.28mg

添加劑

citric acid,I-Menthol,flavor,New coccine ,pH adjusting agent,Silicone resin emulsion,Caramel,Glucose solution,Sugar,Talc,,

使用上的注意事項

諮詢事項

如有以下情況人士，請於使用前諮詢醫師、牙科醫師或藥劑師
正在接受醫師或牙科醫師治療的人。
孕婦或可能懷孕的人。
本人或其家族是敏感體質的人士
曾因藥物引起敏感症狀的人士
如有以下情況，請立即停止使用，並攜帶本產品諮詢醫師、牙科醫師或藥劑師
使用後，出現以下症狀時
皮膚：
發疹、發紅
發癢
使用了1週，症狀仍未見改善時

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。
請置於兒童無法觸及之處保管。
請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
因容易吸濕，開封後請將袋口翻折保管
請勿服用超過使用期限的產品。

11

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- ・本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- ・多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- ・多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- ・关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。