

效能或效果

因咽喉炎症导致声音嘶哑、咽喉难受、咽喉不适、咽喉疼痛、咽喉红肿
口腔内杀菌、消毒，去除口臭

用法及用量

根据不同年龄的服用量，将每一个含在口中，不要咀嚼慢慢溶解
成年人（15岁以上）：1次3个，1天4~6次
5~14岁：1次2个，1天4~6次
未满5岁，不宜使用
※服用时，请每次口含1个。请勿1次服用3个（15岁以上），或2个（5~14岁）
请严格遵守规定的用法用量。
儿童使用时应在监护人指导监督下使用。
请勿咀嚼或吞咽。

成分及分量

18粒中
Cetylpyridinium chloride 8.28mg

添加剂

citric acid, Ascorbic acid, l-Menthol, flavor, Sunset Yellow FCF, pH adjusting agent, Silicone resin emulsion, Glucose solution, Sugar, Talc, ,

使用注意事项**咨询事项**

符合以下情形者请在服用前咨询医生、牙科医生以及药剂师
正在接受医师或牙科医师治疗的人群
孕妇或有其可能性的人群
本人或家人是过敏体质的人群
曾经因为服用药物出现过过敏症状的人群
出现下述症状时，请立即停止服用，并携带本产品咨询医生、牙科医生或药剂师
使用后，出现下述症状的情况
皮肤：
起疹、发红
发痒
即使服用1周后症状仍不见好转的情况

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
请保管在儿童无法触及的地方。
请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）
由于容易潮湿，开封后请折叠袋口进行保管
请勿服用超过使用期限的产品。

11

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任