

복용 전에 이 설명서를 반드시 읽으십시오.
또한, 필요할 때 읽을 수 있도록 보관하십시오.

목 염증으로 인한 목의 통증·따끔거림, 기침에

VICKS MEDICAL TROCHE b

판매명: VICKS MEDICAL TROCHE b

제2류 의약품

<진해거담제>

- ◆ VICKS MEDICAL TROCHE b는 살균 및 소독 작용을 하는 세틸피리디늄 염화물 수화물, 기침을 진정시키는 페놀프탈린산 덱스트로메토르판, 가래를 배출하기 쉽게 해주는 구아야쿨설폰산칼륨을 배합한 진해거담제입니다.
- ◆ 목 염증으로 인한 인후통과 목의 따끔거림, 기침 등의 증상에 효과가 뛰어납니다.
- ◆ 복용하기 편한 포도향의 트로치 제형입니다.



사용 시 주의사항



금지 사항



(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용·사고가 일어날 수 있습니다)

- 1 다음 환자는 복용하지 마십시오
본 약제 또는 본 약제의 성분으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
- 2 본 약제를 복용하는 동안에는 다음 의약품도 사용하지 마십시오
다른 진해거담제, 기침약, 진정제
- 3 복용 후에는 차량 또는 기계류를 운전하지 마십시오
(졸음 증상이 나타날 수 있습니다)



상담



- 1 다음과 같은 사람은 복용하기 전에 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오
(1) 의사에게 치료를 받고 있는 사람.
(2) 임부 또는 임신 중이라고 생각되는 사람.
(3) 약물 등으로 인해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람.
(4) 다음과 같은 증상이 있는 사람.
고온
- 2 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 부작용일 수 있으므로 즉시 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움
소화기	메스꺼움·구토, 식욕 부진
정신신경계	현기증
호흡기	호흡 곤란, 숨이 참


드물게 다음과 같은 위중한 증상이 나타날 수 있습니다.
이 경우 즉시 의사에게 진료를 받으십시오.

증상 명칭	증상
쇼크(아나필락시스)	복용 후 바로 피부 가려움, 두드러기, 목 심, 재채기, 목구멍 가려움, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 증상이 발현한다.

- 3 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 심해질 경우 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오
졸림
- 4 5~6회 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

효능

기침, 가래, 목 염증으로 인한 목소리 갈라짐·목 험·목 불쾌감·인후통·목 부음



용법·용량

다음 양을 2시간 이상 간격을 두고 입안에 넣은 후 씹지 말고 천천히 녹여 주십시오.

연령	1회 용량	복용 횟수
8세 이상	1정	1일 6회
8세 미만	복용하지 마십시오	

[주의]

- (1) 지정된 용법 및 용량을 반드시 준수하십시오.
- (2) 어린이가 복용하는 경우 보호자의 지도 감독 하에 복용해야 합니다.
- (3) 씹어 먹거나 삼키지 마십시오.
- (4) 정제를 꺼내는 방법

그림과 같이 정제가 들어 있는 PTP시트의 돌출부를 손가락 끝으로 세게 눌러 뒷면의 알루미늄 호일이 찢어지면 꺼내서 복용하십시오. (실수로 그대로 삼키면 식도 점막이 찢리는 등 예상치 못한 사고로 이어질 수 있습니다)



성분

1정 중

성분	분량	효능
세틸피리디늄 염화물 수화물	1mg	목을 살균·소독합니다.
페닐프탈린산 메ქ스트로메토르판	7.5mg	기침 중추에 작용하여 심한 기침을 가라앉혀 줍니다.
구아아콜설폰산칼륨	22.5mg	목에 걸린 가래를 부드럽게 만들어 쉽게 배출할 수 있게 도와줍니다.

첨가물: 옥수수 전분, 무수규산, 하이드록시프로필 셀룰로오스, 환원 맥아당 물엿, 스테아린산 Mg, 1-멘톨, 아세살팜 K, 레몬유, 수크랄로스, 구연산, 비타민 B₂, 향료

[주의]

정제에 따라 첨가물인 비타민 B₂로 인해 붉은 반점이 보일 수 있지만 효과는 변함이 없습니다.

보관 및 취급 시 주의사항

- (1) 직사광선이 닿지 않는 서늘하고 습하지 않은 곳에 보관하십시오.
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (3) 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질 유지가 곤란할 수 있습니다)
- (4) 사용기한이 경과된 제품은 복용하지 마십시오. 사용기한이 지나지 않았어도 개봉 후에는 6개월 이내에 복용하십시오. (품질 유지를 위해)



【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가변역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.