

服用前請務必閱讀本說明書。  
此外，請妥善保管以備不時之需。

緩解因喉嚨發炎引起的喉嚨痛、喉嚨癢、咳嗽

# VICKS MEDICAL TROCHE b

銷售名稱：VICKS MEDICAL TROCHE b **第二類醫藥品** <鎮咳祛痰藥>

- ◆ VICKS MEDICAL TROCHE b 是含有具殺菌、消毒作用的十六烷基氯化吡啶、鎮咳的酚酞右美沙芬、祛痰的愈創木酚磺酸鉀之鎮咳祛痰藥。
- ◆ 對喉嚨發炎引起的喉嚨痛、喉嚨癢、咳嗽等症狀可發揮優異的效果。
- ◆ 易於服用、葡萄口味的口含錠。



## 使用上的注意事項



## 禁止事項

(若不遵守，可能導致目前的症狀惡化，或者容易引發副作用、意外)

- 1 符合下列情形者請勿服用  
曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。
- 2 服用本藥劑的期間，請勿使用下列任何一種醫藥品  
其他鎮咳祛痰藥、感冒藥、鎮靜藥
- 3 服用後請勿駕駛交通工具或操作機械  
(可能出現嗜睡等)



## 諮詢事項



- 1 下列人士服用前，請先諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
  - (1) 正在接受醫師治療者。
  - (2) 孕婦或可能懷孕者。
  - (3) 曾因藥物等引發過敏症狀者。
  - (4) 有下列症狀的人。  
發高燒
- 2 服用後，出現下列症狀即可能為副作用，請立即停止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	出疹、發紅、發癢
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
精神神經系統	暈眩
呼吸器官	呼吸困難、呼吸短促


曾發生下列罕見嚴重症狀。  
如遇到此類情況，請立刻接受醫師診療。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

- 3 服用後可能出現下列症狀，如該症狀持續或加劇，請停止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
嗜睡
- 4 若服用 5~6 次症狀卻未見改善，請停止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 療效

因咳嗽、生痰、喉嚨發炎導致的聲音沙啞、喉嚨乾燥、喉嚨不適、喉嚨痛、喉嚨腫



## 用法及用量

請間隔 2 小時以上將以下的量含在口中，  
不要嚼碎，使其慢慢溶解。

年齡	1次量	服用次數
8歲以上	1 錠	1 天 6 次
未滿8歲	不可服用	

### [ 注意 ]

- (1) 請務必遵守規定用法、用量。
- (2) 若為兒童服用，請在家長的指導和監督下服用。
- (3) 請勿嚼碎或吞嚥。
- (4) 錠劑取出方法

如圖所示，以指尖用力按壓裝有錠劑之 PTP 泡殼的凸出部位，使鋁箔背膜破裂後取出服用。(不慎誤食包裝將可能造成刺傷食道黏膜等意外事故發生)

(錠劑取出圖)  
壓出



## 成分

1 錠中

成分	分量	效用
十六烷基氯化吡啶	1mg	對喉嚨殺菌、消毒。
酚酞右美沙芬	7.5mg	對咳嗽中樞發揮作用，緩解難受的咳嗽。
癒創木酚磺酸鉀	22.5mg	軟化喉部痰液，有助祛痰。

添加物：玉米澱粉、二氧化矽、羥丙基纖維素、還原麥芽糖漿、硬脂酸鎂、l-薄荷醇、醋磺內酯鉀、檸檬油、三氯蔗糖、檸檬酸、維生素 B<sub>2</sub>、香料

### [ 注意 ]

添加物中的維生素 B<sub>2</sub> 可能造成部分錠劑出現紅色斑點，但藥效不變。

## 保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於濕度較低的陰涼處，避免日光直射。
- (2) 請保管於兒童無法觸及之處。
- (3) 請勿換裝至其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- (4) 請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於 6 個月內服用完畢。(這是為了確保品質)



### 【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。