

◆ Zena King은 중국에서 강장생약으로 이용되어 온 Young deer horn 및 Cistanche herb, 브라질 원산의 강장생약 Muirapuama를 비롯해 총 17종의 생약(원생약으로서 총 6,050mg상당)과 Taurine, Vitamin을 배합한 미니 드링크제입니다. ■업무가 바빠 휴식을 취하지 못해 피로가 좀처럼 풀리지 않고, 평소 쉽게 피곤을 느끼며 무리를 할 수 없게 되는 등의 원인에는 생리적인 기능 저하도 원인으로 생각됩니다.

효능 또는 효과

육체 피로·병중 및 병후·영양 장애·발열성 소모성 질환
식욕 부진
임신 수유기 등의 경우의 영양공급
자양강장
허약 체질

용법 및 용량

성인(15세 이상) 1일 1회 1병(50mL)을 복용하십시오.
15세 미만, 복용하지 말 것
정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.
본제는 생약 성분을 포함하므로 드물게 침전물이 생길 수 있지만, 약효는 변함 없습니다.
잘 흔들어서 복용하십시오.

성분 및 분량

In 50 mL
Cistanche Herb Extract 151.6mg (equivalent to 500 mg of the crude drug)
Fur Seal Penis and Testis Fluid Extract 0.1mL (equivalent to 100 mg of the crude drug)
Antler Velvet Tinctures 1.08mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Epimedium Herb extract 100mg (equivalent to 1000 mg of the crude drug)
Tochukaso Fluid Extract 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Cnidium Monnieri Fruit extract 600mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Dodder Seed Extract 33mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Eucommia Bark Extraction Liquid 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Muirapuama Extract-A 15mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Ginseng extractM 90mg (equivalent to 600 mg of the crude drug)
Dioscorea Rhizome Fluid Extract 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Agkistrodon Meat and Bones Tinctures 1.25mL (equivalent to 250 mg of the crude drug)
Cornus Fruit Fluid Extract 0.5mL (equivalent to 500 mg of the crude drug)
Poria Sclerotium extract 9.6mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Schisandra Fruit Fluid Extract 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Glycyrrhiza Extract 25mg (equivalent to 100 mg of the crude drug)
Rehmannia Root Extract-A 150mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 500mg
Riboflavin sodium phosphate 5mg
Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B6) 5mg
Anhydrous caffeine 50mg

첨가물

Sugar, Butyl parahydroxybenzoate, Sodium benzoate, Polyoxyethylene hydrogenated castor oil, Povidone, citric acid, Sodium citrate, flavor, Ethyl vanillin, l-Menthol, alcohol (not more than 1.5mL)

성분 및 분량에 관한 주의

본제의 복용으로 인해 소변 색깔이 노래지는 경우가 있으나, 이는 약에 포함되어 있는 Vitamin B2가 흡수됨에 따른 것으로 걱정하실 필요 없습니다.

사용상의 주의

상담할 내용

- 복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것
- 피부:
발진
- 소화기:
위부 불쾌감
- 복용 후 다음 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.
- 설사
- 한동안 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.

보관 및 취급상의 주의

직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

71

【OTC 의약품의 다언어 제품 정보에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다..