

◆ Zena King含中國作為天然強身藥材使用的鹿茸、肉蓯蓉、巴西原產的強身天然藥材muirapuama等，多達17種的天然藥材（相等於原藥材6050mg）以及taurine、維生素配方的小包裝能量飲料。■工作繁忙無法休息使得身體疲勞難以消除、日常疲勞易於累積、無法勉強工作等原因皆為生理機能下降所導致。因上述狀況或罹患感冒等發熱性消耗性疾病而感到體力衰竭時作為補充營養之用、重要時刻想加把勁時作滋養強身之用，效果優異。

療效或效果

身體疲勞、病中病後、營養障礙、發熱性消耗性疾患
食欲不振
懷孕哺乳期等的營養補充
滋養強身
虛弱體質

用法及用量

成人（15歲以上）1天1次1枝（50mL）服用。
未滿15歲者，請勿服用
請務必遵守規定用法、用量。
本劑含天然藥材成分，如有沉澱屬正常現象，藥效並不受影響。
請充分搖勻後再行服用。

成分及分量

50mL 中
Cistanche Herb Extract 151.6mg (equivalent to 500 mg of the crude drug)
Fur Seal Penis and Testis Fluid Extract 0.1mL (equivalent to 100 mg of the crude drug)
Antler Velvet Tinctures 1.08mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Epimedium Herb extract 100mg (equivalent to 1000 mg of the crude drug)
Tochukaso Fluid Extract 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Cnidium Monnieri Fruit extract 600mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Dodder Seed Extract 33mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Eucommia Bark Extraction Liquid 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Muir Puama Extract-A 15mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Ginseng extractM 90mg (equivalent to 600 mg of the crude drug)
Dioscorea Rhizome Fluid Extract 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Agkistrodon Meat and Bones Tinctures 1.25mL (equivalent to 250 mg of the crude drug)
Cornus Fruit Fluid Extract 0.5mL (equivalent to 500 mg of the crude drug)
Poria Sclerotium extract 9.6mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Schisandra Fruit Fluid Extract 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Glycyrrhiza Extract 25mg (equivalent to 100 mg of the crude drug)
Rehmannia Root Extract-A 150mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 500mg
Riboflavin sodium phosphate 5mg
Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B6) 5mg
Anhydrous caffeine 50mg

添加劑

Sugar, Butyl parahydroxybenzoate, Sodium benzoate, Polyoxyethylene hydrogenated castor oil, Povidone, citric acid, Sodium citrate, flavor, Ethyl vanillin, l-Menthol, alcohol (not more than 1.5mL)

成分及分量相關的注意事項

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素B2的影響，無須擔憂

使用上的注意事項

諮詢事項

- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：
發疹
消化器官：
胃部不適感
- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
腹瀉
- 即使服用一陣子，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射的陰涼處保管
請置於兒童無法觸及之處保管。
請勿服用超過使用期限的產品。

71

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。