

療效或效果

- ☆維持及改善體力、身體抵抗力及集中力
- ☆恢復及預防疲勞
- ☆改善及預防虛弱體質(包括隨年齡增加而變得身體虛弱)引起的身體不適：
腸胃弱，容易有腹痛及腹瀉
容易疲倦、疲勞累積、失去體力、身體沉重、倦怠感
皮膚狀況不佳(皮膚粗糙、皮膚乾燥)
容易發冷
血液循環不佳
骨質及牙齒的衰退
- ☆改善及預防在日常生活中因營養不良而引起的身體不適
容易疲倦、疲勞累積、失去體力、身體沉重、倦怠感
因宿醉而引起的食慾不振及倦怠感
- ☆病時病後體力不支時、患上發燒性消耗性疾患時、食慾不振時、產婦哺乳期或產前產後等的營養補給

用法及用量

成人(15歲以上) 1天1次1枝(50mL)服用。
未滿15歲者，請勿服用

〔注意事項〕

請務必遵守規定用法、用量。
(若服用其他含有維生素等的產品，請注意不要攝取過量)
本劑含天然藥材成分，如有沉澱屬正常現象，藥效並不受影響。
請充分搖勻後再行服用。

成分及分量

1枝(50mL)中
Ginseng extract-P 85.8mg (equivalent to 600 mg of the crude drug)
Muir Puama Extract-A 15mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Cistanche Herb Extract 75.8mg (equivalent to 250 mg of the crude drug)
Peony Root extract 30mg(equivalent to 120 mg of the crude drug)
Glycyrrhiza Extract 50mg(equivalent to 200 mg of the crude drug)
Cinnamon Bark Fluid Extract 0.15mL(equivalent to 150 mg of the crude drug)
Ginger Fluid Extract 0.3mL(equivalent to 300 mg of the crude drug)
Taurine 500mg
Riboflavin sodium phosphate 5mg
Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) 5mg
Nicotinamide 20mg
Anhydrous caffeine 50mg

添加劑

白糖
還原麥芽糖漿
pH 調節劑
聚氧乙炔氫化蓖麻油
普維酮
苯甲酸鈉
對羥基苯甲酸酯
焦糖
香料
酒精(酒精含量0.17 毫升以下)

〔注意事項〕

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素B2的影響，無須擔憂

使用上的注意事項**諮詢事項**

- 服用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
- 皮膚：
發疹
- 消化器官：

胃部不適感

●服用後可能出現下列症狀，如該症狀持續或加重時，請停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

腹瀉

●持續服用一段時間症狀仍未見改善時，請停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射的陰涼處保管

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿服用超過使用期限的產品。

11

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。