

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

アミノ酸・オウセイ・クコシ

**アニマリンA**

販売名：リポビタミンアミノアルファ  
指定医薬部外品

### 【使用上の注意】

#### 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1)服用後、次の症状があらわれた場合。  
皮ふ：発疹／消化器：胃部不快感  
(2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。
2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
下痢

### 【効能】

☆肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給  
☆滋養強壮 ☆虚弱体質

### 【用法・用量】

成人（15才以上）1日1回1本（50mL）を服用してください。

※ 15才未満は服用しないでください。

#### 【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。（他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください）
- (2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

### 【成分】 1本（50mL）中

タウリン	1000mg	リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B <sub>2</sub> )	5mg
L-バリン	80mg	ピリドキシン塩酸塩 (V.B <sub>6</sub> )	10mg
L-イソロイシン	100mg	無水カフェイン	50mg
L-ロイシン	240mg	オウセイ流エキス	0.24mL(オウセイ240mgに相当)
L-アルギニン塩酸塩	300mg	クコシ流エキス	0.2mL(クコシ200mgに相当)
チアミン硝酸塩 (V.B <sub>1</sub> )	5mg		

添加物：転化型液糖（ブドウ糖、果糖、ショ糖）、DL-リンゴ酸、安息香酸 Na、クエン酸水和物、香料、アルコール、エチルバニリン、バニリン、プロピレングリコール（アルコール 0.2mL 以下）

#### 【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B<sub>2</sub>によるものでご心配ありません。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

大正製薬(株) お客様 119 番室  
電話 03-3985-1800

発売元 **大正製薬株式会社**<sup>21</sup>  
東京都豊島区高田3丁目24番1号

製造 **大同薬品工業株式会社**  
販売元 奈良県葛城市新村214番地1

—本文は、直接ラベルに記載されている事項です—