

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	メディトリート
2	成分・分量	1 個中 ミコナゾール硝酸塩 100mg
3	用法・用量	成人(15 歳以上 60 歳未満)、1 日 1 回 1 個を就寝前に膣深部に挿入してください。なお、6 日間連続して使用してください。ただし、3 日間使用しても症状の改善がみられないか、6 日間使用しても症状が消失しない場合は、医師の診療を受けてください。
4	効能・効果	膣カンジダの再発 (過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください</p> <p>(1)初めて発症したと思われる人。</p> <p>(2)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(3)15 歳未満又は 60 歳以上の人。</p> <p>(4)妊婦又は妊娠していると思われる人。</p> <p>(5)発熱、悪寒、下腹部痛、背中や肩の痛み、色のついた又は血に染まったおりもの、魚臭いおりもの、生理の停止、膣からの不規則又は異常な出血、膣又は外陰部における潰瘍、浮腫又はただれがある人。</p> <p>(6)次の診断を受けた人。 糖尿病</p> <p>(7)ワルファリン等の抗凝血剤を服用している人。</p> <p>(8)本疾病を頻繁に繰り返している人。(1~2カ月に1回又は6ヵ月以内に2回以上)</p> <p>(9)膣カンジダの再発かわからない人。</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください 膣内以外の部位。</p> <p>3. 本剤を使用中に次の医薬品を外陰部に使用しないでください カンジダ治療薬以外の外用薬。</p> <p>4. 次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・授乳中の人。
6	薬剤師が必要 と判断する 事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。