

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	コ-ラックII
2	成分・分量	3錠中 ビサコジル 15mg ジオクチルソジウムスルホサクシネート(DSS) 24mg
3	用法・用量	次の量を1日1回、就寝前(又は空腹時)に水又はぬるま湯で服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。 15才以上 1回1~3錠、11才~14才 1回1~2錠 11才未満 服用しないこと
4	効能・効果	○便秘 ○便秘に伴う次の症状の緩和： 頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の瀉下薬(下剤) 2. 大量に服用しないでください 3. 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・次の症状のある人。 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。