

使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

# パブロン鼻炎アタックJL

## 〈季節性アレルギー専用〉

販売名：パブロン鼻炎アタックJL〈季節性アレルギー専用〉 **第2類医薬品** 〈鼻炎用点鼻薬〉

- ◆パブロン鼻炎アタックJL(季節性アレルギー専用)のベクロメタゾンプロピオン酸エステルは、患部でよく効き、体内に吸収されると分解される全身性作用が少ないアンテドラッグ型ステロイドです。
- ◆有効成分が霧状の微粒子となって鼻の奥深くまで均一にいきわたり、薬液が炎症患部でジェル化するので液だれしにくく、スーッとした使用感の点鼻薬です。



## 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1 次の人は使用しないでください
  - (1) 次の診断を受けた人。  
全身の真菌症、結核性疾患、高血圧、糖尿病、反復性鼻出血、ぜんそく、緑内障、感染症
  - (2) 鼻孔が化膿(毛根の感染によって、痛みやはれを伴う)している人。
  - (3) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 18才未満の人。
  - (5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (6) ステロイド点鼻薬を過去1年のうち3ヵ月以上使用した人。
- 2 本剤は、他のステロイド点鼻薬の使用期間も合わせて、1年間に3ヵ月を超えて使用しないでください(3ヵ月を超えた使用が必要な場合には、他の疾患の可能性がありますので耳鼻咽喉科専門医にご相談ください)
- 3 本剤の使用後は、ステロイド点鼻薬を使用しないでください。ただし、医師から処方された場合はその指示に従ってください



## 相談すること

- 1 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
  - (3) 頭、額や頬などに痛みがあり、黄色や緑色などの鼻汁のある人(感染性副鼻腔炎)。
  - (4) 授乳中の人。
  - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6) 季節性アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
  - (7) 高齢者。
  - (8) 肥厚性鼻炎<sup>\*1</sup>や鼻たけ(鼻ポリープ)<sup>\*2</sup>の人。  
※1：鼻のまわりが重苦しく、少量の粘液性又は黄色や緑色の鼻汁がでる。  
※2：鼻づまり、鼻声、鼻の奥の異物感などがある。
  - (9) 長期又は大量の全身性ステロイド療法を受けている人。
- 2 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
鼻	鼻出血、鼻の中のかさぶた、刺激感、かゆみ、乾燥感、不快感、くしゃみの発作、嗅覚異常、化膿症状(毛根の感染によって、膿(うみ)がたまり、痛みやはれを伴う)
のど	刺激感、異物感、化膿症状(感染によって、のどの奥に白っぽい膿(うみ)がたまり、痛みやはれを伴う)
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
精神神経系	頭痛、めまい
消化器	吐き気・嘔吐、下痢、食欲不振
循環器	動悸
その他	ぜんそくの発現、目の痛み、目のかすみ、血圧上昇

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 3 頭、額や頬などに痛みがでたり、鼻汁が黄色や緑色などを呈し、通常と異なる症状があらわれた場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(他の疾患が併発していることがある。)
- 4 1週間位(1日最大4回(8噴霧まで))使用しても症状の改善がみられない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効 能

花粉による季節性アレルギーの次のような症状の緩和：  
鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ

## 用法・用量

通常、次の量を左右の鼻腔内に噴霧してください

年 令	1 回	使用回数
成人(18才以上)	左右の鼻腔内にそれぞれ 1回1度ずつ噴霧	1日2回 (朝・夕)
18才未満	使用しないこと	

1日最大4回(8噴霧)まで使用してもかまいませんが、使用間隔は3時間以上おいてください。症状が改善すれば使用回数を減らしてください。症状が再び悪化した場合は、使用回数を増やしてもかまいません。1年間に3か月を超えて使用しないでください。

### 【注意】

(1)本剤はベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)を配合していますので、過量に使用したり、間違った使用方法で使用すると、副作用が起こりやすくなる場合がありますので、定められた用法・用量を厳守してください。

(2)点鼻用にのみ使用してください。

### 【使い方】

☆使用前に容器をよく振ると、液がスムーズにでやすくなります。

☆初めてご使用の際は、容器の構造上薬液が霧状になりにくいので、ノズル(容器の先端部分)を上に向け、薬液が霧状になるまで回数空押しを行ってください(予備噴霧)。薬液が霧状にできれば投与準備完了です(この予備噴霧は初回のみ行ってください)。

①鼻腔の通りを良くするため、静かに鼻をかみます。



②容器をよく振ってからキャップをはずし、上向きに容器を持ってください。



③ノズルが鼻中隔<sup>※1</sup>に向かないようまっすぐ上向きに持って、軽く鼻腔内に入れてください。



④息を軽くすいながら鼻腔内にまっすぐ入れた状態<sup>※2</sup>で両側の鼻孔に1回ずつしっかり噴霧してください。



⑤噴霧後は薬剤を鼻の奥まで広く行きわたらせるために、頭を後ろに傾けた状態で、数秒間、鼻で静かに呼吸してください。



⑥使用後は、ノズル付近を清潔なティッシュペーパー等でふき、キャップをしてください。



この時、反対側の鼻孔は指でおさえてふさいでください。(弱くゆっくり押すと、薬液が霧状にならず、液だれの原因になります)

★ノズルの先端を針等で突くのは折れたとき大変危険ですのでおやめください。

※1 鼻中隔:鼻の穴の中にある鼻腔を左右に仕切る隔壁

※2 特に右利きの人では右の鼻中隔に、左利きの人では左の鼻中隔に向きやすいので注意してください。

## 成 分

100g中

成 分	分量	はたらき
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	0.1g	炎症を鎮めてアレルギー症状を抑えます。

添加物:ベンザルコニウム塩化物、ポリソルベート80、セルロース、カルメロースNa、グリセリン、プロピレングリコール、クエン酸Na、クエン酸、ジェランガム、L-メントール

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<http://www.taisho.co.jp>

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話: 0120-149-931(フリーダイヤル)