

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	パブロン点鼻クイックJL
2	成分・分量	100mL 中 ケトチフェンフマル酸塩 75.6mg ナファゾリン塩酸塩 25mg
3	用法・用量	成人(15才以上)及び7才以上の小児 1回に1度ずつ、1日4回(朝・昼・夕方及び就寝前)両鼻腔内に噴霧してください。(1噴霧でケトチフェンとして0.05mg) 連続して2週間を超えて使用せず、再び使用する場合は2週間以上あけてください。 7才未満は使用しないでください。
4	効能・効果	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和: 鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 次の人には使用しないでください 7才未満の小児 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります) 授乳中の方は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合は授乳を避けてください (動物試験で乳汁中への移行が認められています) 長期連用しないでください (連続して使用する場合は、2週間以上あけてください) 次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"> 医師の治療を受けている人。 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。 妊婦又は妊娠していると思われる人。 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障 <p>【小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。】</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。