

プリザエース軟膏
使用上の注意改訂のお知らせ

本製品の使用上の注意を下記のとおり改訂いたします。
つきましては、改訂内容をご確認いただき、本製品の適正使用をお願い
申し上げます。

記

<改訂内容>

改訂前	改訂後（___：改訂箇所）				
<p>「してはいけないこと」 次の人は使用しないでください</p> <p>「相談すること」 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p>	<p>「してはいけないこと」 次の人は使用しないでください <u>本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</u></p> <p>「相談すること」 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください <u>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</u></p> <table border="1" data-bbox="810 1406 1517 1608"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 1406 1023 1451">症状の名称</th> <th data-bbox="1023 1406 1517 1451">症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 1451 1023 1608"><u>ショック（アナフィラキシー）</u></td> <td data-bbox="1023 1451 1517 1608"><u>使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。</u></td> </tr> </tbody> </table>	症状の名称	症状	<u>ショック（アナフィラキシー）</u>	<u>使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。</u>
症状の名称	症状				
<u>ショック（アナフィラキシー）</u>	<u>使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。</u>				

以上