

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

外用鎮痛消炎 plaster

〈温感〉

トクホンエース ホット

トクホンエースホット

第3類医薬品

【使用上の注意】

■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

- 1) 目の周囲、粘膜など
- 2) 湿疹、かぶれ、傷口

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

・薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人

2. 使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛みなどの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法及び用量】

薬剤面をおおったフィルムをはがし、1日数回患部に貼付してください。

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、刺激が強く感じられることがあるため、13才未満の人への使用はさけてください。
2. 患部を清潔にしてから使用してください。
3. 皮膚の弱い人は同じ所に続けて使用しないでください。
4. 使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛みなどの症状がおきないことを確かめてから使用してください。
5. 入浴の1時間前にははがしてください。はがした直後に入浴すると強い刺激を感じる場合があります。
6. 貼ったまま患部をこたつや電気毛布等で温めないでください。

【成分及び分量】 有効成分 膏体 100g (0.455m²) 中

成分	分量
l-メントール	1.0g
サリチル酸グリコール	2.0g
ノニル酸ワニリルアミド	0.013g
ビタミンE酢酸エステル	0.8g

添加物として酸化チタン、ジブチルヒドロキシトルエン、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、二酸化ケイ素、ポリイソブチレン、マクロゴール、流動パラフィン、エステルガム、その他1成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 開封後は、袋の開封口を折り曲げて保管し、早めに使用してください。
4. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

大正製薬(株) お客様 119 番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

発売元 ³¹
大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元
株式会社 トクホン
東京都豊島区高田3丁目26番3号

——本文は、直接外箱に記載されている事項です——