

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

腰痛・関節痛・打撲・ねんざ

# トクホンハップ<sup>®</sup>薄伸び冷

トクホンハップ薄伸び冷

第3類医薬品

## ⚠ 使用上の注意

### ■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

1)目の周囲、粘膜など 2)湿疹、かぶれ、傷口

### ■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

・薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

## 【用法及び用量】

表面のプラスチックフィルムをはがして、1日1～2回患部に貼付してください。

- 定められた用法・用量をお守りください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- 汗をかいている時は、よくふきとってからご使用ください。
- 使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみなどの症状がおきないことを確かめてから使用してください。
- 患部の広さに応じて、フィルムの上から適当な大きさにハサミで切ってご使用ください。

## 【成分及び分量】 有効成分 膏体 100g 中（1枚あたり膏体量7g）


成 分	分 量	はたらき
サリチル酸メチル	1.0g	炎症を抑え痛みをやわらげる
l-メントール	0.6g	知覚神経を軽くマヒさせる
dl-カンフル	1.0g	痛みをやわらげる

添加物としてポリビニルアルコール（部分けん化物）、ポリアクリル酸部分中和物、D-ソルビトール、グリセリン、ポリソルベート80、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ケイ酸アルミン酸 Mg、カオリン、エデト酸 Na 水和物、pH 調節剤、パラベンを含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 開封後は袋のチャックを閉めて保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

大正製薬(株) お客様 119 番室  
電話 03-3985-1800  
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度  
 0120-149-931

発売元  
**大正製薬株式会社**<sup>11</sup>  
東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元  
**東光薬品工業株式会社**  
東京都足立区新田2-16-23

——本文は、直接外箱に記載されている事項です——