

ご使用に際してこの説明書きを必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

【してはいけないこと】

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の部位には使用しないでください
 - 1) 目の周囲、粘膜等。
 - 2) 湿疹、かぶれ、傷口。

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み等の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能】

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、しもやけ、打撲、捻挫、骨折痛

【成分】

有効成分 100mL中
 l-メントール……………6.0g
 サリチル酸グリコール……………6.5g
 ノニル酸ワニリルアミド……………8mg
 ビタミンE酢酸エステル……………0.5g
 グリチルリチン酸……………0.1g
 添加物:アルコール

【保管及び取扱い上の注意】

- ①直射日光の当たらない涼しい所にキャップを閉めて保管してください。
- ②火気に近づけないでください。
- ③小児の手の届かない所に保管してください。
- ④他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- ⑤本剤配合のアルコールなどは、プラスチック製品や家具・調度品などの塗装を傷つけることがありますので、薬液がつかないように注意してください。
- ⑥使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

大正製薬

肩こり

微香性

100mL



肩こり・腰痛・筋肉痛

トクホンチールA

外用鎮痛消炎液剤

第3類医薬品

すっきり爽快タイプ

TOKUHON

【用法・用量】

適量を1日数回患部に塗布してください。

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、刺激が強く感じられることがあるため、13才未満の人への使用はさけてください。
2. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯でよく洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
3. 外用にのみ使用し、内服しないでください。
4. 入浴の1時間前には使用しないでください。使用直後に入浴すると強い刺激を感じる場合があります。
5. 皮膚の弱い人は同じ所に続けて使用しないでください。
6. 使用前に腕などに少量を塗布し、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
7. 塗布した所はよく乾かしてください。乾かないうちに衣類などが触れると、変色することがありますので注意してください。
8. 強い刺激を感じた場合には、よく泡立てた石鹸でやさしく患部を洗い流し、その後よく冷やしてください。

第3類医薬品

【内容量】100mL 販売名:チールA

火気厳禁 第二石油類
水溶性 危険等級Ⅲ 100mL

大正製薬(株) お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

発売元

大正製薬株式会社⁴¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<https://www.taisho.co.jp/>

製造販売元

株式会社 トクホン
東京都豊島区高田3丁目26番3号

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

すっきり爽快タイプ

大正製薬

開封口

腰痛

微香性

100mL



肩こり・腰痛
筋肉痛

第3類医薬品

トクホンチールA

外用鎮痛消炎液剤

100mL 第3類医薬品