

トクホン Aroma S

第3類医薬品

▲ 使用上の注意

■ **してはいけないこと**(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
1) 目の周囲、粘膜等。 2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用中又は使用后、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

肩こり、筋肉疲労、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、関節痛、しもやけ、骨折痛

用法・用量

薬剤面をおおったフィルムをはがし、1日数回患部に貼付してください。

【注意】

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
また、刺激が強く感じられることがあるため、7才未満の人への使用はさけてください。
2. 患部を清潔にしてから使用してください。
3. 皮膚の弱い人は同じ所に続けて使用しないでください。
4. 使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分

膏体100g (0.625m²) 中
サリチル酸グリコール・・・・・・・・5.0g
l-メントール・・・・・・・・1.5g
ビタミンE酢酸エステル・・・・・・・・2.0g
グリチルレチン酸・・・・・・・・0.18g

添加物：スチレン・イソプレン・スチレン
ブロック共重合体、ポリイソブチレン、
流動パラフィン、エステルガム、ジブチル
ヒドロキシトルエン、香料、フェニルエチル
アルコール、その他1成分

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない、涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 開封後は未使用分はもとの袋に入れ、袋の開封口をきちんと折り曲げて保管してください。
(品質保持のため)
4. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

発売元

大正製薬株式会社¹¹

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://www.taisho.co.jp/>

製造販売元

株式会社 トクホン

東京都豊島区高田3丁目26番3号

大正製薬(株)お客様119番室

☎ 03-3985-1800

☎ 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



副作用被害救済制度

☎ 0120(149)931

PE, 金属

使用期限

(西暦 年月)

製造番号