

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

つらい疲れに

# リポビタミンゴールド エース

リポビタミンゴールドエース

第2類医薬品

## 【使用上の注意】

相談すること



1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能】

☆滋養強壮 ☆虚弱体質 ☆肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

## 【用法・用量】

成人（15才以上）1日1回1本（50mL）を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

## 【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

## 【成分】 1本（50mL）中

タウリン	1500mg	リポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB <sub>2</sub> )	5mg
ローヤルゼリー	200mg	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	5mg
ニンジン軟工エキス-B	90mg (人参630mgに相当)	トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	30mg
オウギ流エキス-C	0.2mL (黄耆200mgに相当)	ニコチン酸アミド	20mg
ハゲキテン流エキス	0.2mL (巴戟天200mgに相当)	イノシトール	100mg
チアミン硝化物(ビタミンB <sub>1</sub> )	5mg	無水カフェイン	50mg

添加物：白糖、D-ソルビトール、スクラロース、アセスルファムK、ポビドン、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、安息香酸Na、クエン酸、クエン酸Na、香料、アルコール、バニリン（アルコール0.2mL以下）

## 【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB<sub>2</sub>によるもので、ご心配ありません。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

大正製薬(株) お客様119番室  
電話 03-3985-1800

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

大正製薬  株式会社<sup>21</sup>  
東京都豊島区高田3丁目24番1号

—本文は、直接ラベルに記載されている事項です—