

RiUP *JET*

説明書

RiUP JET

第1類医薬品

リアップジェット

壮年性脱毛症における発毛剤

ミノキシジル

毛乳頭細胞に直接働きかける発毛成分

パントテニールエチルエーテル

毛細胞に栄養を補給

トコフェロール酢酸エステル

皮脂の酸化を防ぎ頭皮を保護

1-メントール

頭皮のかゆみをおさえ、清涼感をあたえる

- ◆ リアップジェットは、発毛成分ミノキシジルを配合した心地よい使用感のジェット噴射式エアゾールです。
- ◆ 頭皮に直接押しあてて15噴射することにより、1回使用量を手軽に塗布できる定量噴射容器を採用しました。
- ◆ ミノキシジルが毛包に直接作用して、発毛、育毛効果を発揮するとともに、その他の成分が頭皮の環境をととのえ、清涼感をあたえます。

安全に、かつ効果的にお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。

安全に、かつ効果的にお使いいただくために…

目次

使用上の注意／してはいけないこと	3
使用上の注意／相談すること	4
使用上の注意／その他の注意	6
効能・効果	7
成分・分量	7
用法・用量	8
容器の使用方法	9
保管及び取扱い上の注意	11
正しい洗髪方法	11
1日2回のヘアケア習慣	12
ヘアケアQ&A	13
お困りのことがあったら	14

リアップジェットは、
「壮年性脱毛症^{*}における発毛剤」です。

髪が成長するには時間がかかります。発毛の効果を
実感するまで、少なくとも6ヵ月間、用法・用量を守って
正しくお使いください。

また、その後は脱毛の進行予防の効果(既に始まって
しまった脱毛がそれ以上進行するのを防ぐ効果)を維持
するためにも、継続してご使用になることをおすすめ
いたします。

^{*} 壮年性脱毛症とは、一般的に遺伝性の薄毛又は抜け毛で、ゆっくりと
何年もかかって進行し、目立つようになるものです。

使用上の注意

⊗ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。

① 次の人は使用しないでください。

1 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2 女性。

女性の方はリアップシリーズの女性用製品をご使用ください。

3 未成年者(20歳未満)。

国内での使用経験がありません。

4 壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。

本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。

5 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。

壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。

② 次の部位には使用しないでください。

1 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。

血圧が下がる等のおそれがあります。

2 きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。

きず等を悪化させることがあります。

3 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。

これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。



相談すること

1 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

1 今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

2 高血圧の人、低血圧の人。

本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。

3 心臓又は腎臓に障害のある人。

本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。

4 むくみのある人。

むくみを増強させる可能性が考えられます。

5 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。

壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。

6 高齢者(65歳以上)。

一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。

7 次の診断を受けている人。 甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。

甲状腺疾患による脱毛の可能性ががあります。

2 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等
精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい
循 環 器	胸の痛み、心拍が速くなる
代 謝 系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ

*:頭皮以外にあらわれることもあります。

3 1年間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度。(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)

壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。

- 4** 使用開始後1年以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛など。

壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。

その他の注意

- 1** 毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも6ヵ月間、毎日使用してください。

本剤の有効性は6ヵ月間使用した場合に認められています。

- 2** 毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。

- 3** 効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。


本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。

効能・効果

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び
脱毛(抜け毛)の進行予防。

この医薬品の対象となる壮年性脱毛症

リアップジェットは、以下のようなパターンの
脱毛あるいは薄毛に効果があります。



※脱毛範囲がこれら以上の場合には効果が得られない可能性があります。

成分・分量

薬液 100mL中

成分	分量	はたらき
ミノキシジル	1.0g	発毛、育毛及び脱毛の進行を予防します。
パントテニール エチルエーテル	1.0g	毛細胞に栄養を補給し、頭皮を健全な状態にします。
トコフェロール 酢酸エステル	0.08g	皮脂の酸化を防ぎ、頭皮を保護します。
l-メントール	0.3g	頭皮のかゆみをおさえ、清涼感をあたえます。

添加物：カミツレ油、1,3-ブチレングリコール、クエン酸、エタノール、DME
(内容量 100mL中には薬液 67mL、噴射剤 33mLを配合)