

◆ Iris CL-I Neo是含有taurine的眼泪型眼药水。戴着隐形眼镜直接滴眼并不含有吸附在隐形眼镜并累积导致变性的成分。因此，即使戴着软性、一次性在内的O2、硬性隐形眼镜，也可以放心地直接滴在眼睛上，可以温和护理戴着隐形眼镜的眼睛。田眼滴眼(眼睛干涩) 药剂中不会引发干涩眼睛的刺激以及引起问题的防腐剂，含眼泪成分 (sodium chloride、potassium chloride) 和taurine。因此会向干涩的眼睛提供湿润和营养，温和地改善使用电脑时等的干眼(眼睛干涩)、眼睛疲劳问

效能或效果

眼睛疲劳、泪液辅助(眼睛干燥)、佩戴硬性隐形眼镜或软性隐形眼镜时的不适感、眼睛发痒(眼眨较多时等)

用法及用量

请按1天3~6次，1次2~3滴点眼。

请严格遵守规定的用法用量。

儿童使用时应在监护人指导监督下使用。

容器端部请勿触碰眼皮、睫毛。且，请勿使用混浊的产品。

仅限作为滴眼药水使用。

开封时请勿强行拉开。此外，开封时用力的话可能会使药液飞散，因此请注意。

本药剂为"1次性"滴眼液不含防腐剂，因此使用后的剩余液体请倒掉。

成分及分量

Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 1%

Sodium chloride 0.50%6

Potassium chloride 0.10%13

添加剂

Sodium bicarbonate,pH adjusting agent

使用注意事项

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

因药物等出现过过敏症状的人群

拥有以下症状的人群

眼睛剧烈疼痛

接受以下诊断的人群

青光眼

使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹、发红

发痒

眼睛：

充血

发痒

红肿

●下述情况时应中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

未改善视线模糊时。

使用2周左右后症状仍无改善时。

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射的阴凉场所

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质。)

请勿与其他人共用

请勿置于汽车的仪表板等高温下。(会发生容器变形或药液的质量劣化)

请注意如果将产品放进裤子的后口袋等，盖子有可能会打开。

请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。(为了保证质量)

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任