

◆IRIS 50眼药水含有改善视距调节功能的neostigmine methylsulfate、维生素B12和促进新陈代谢的维生素B2、taurine。■对于视线模糊、眼睛疲劳等
症状效果显著。■具有舒适的使用效果。

效能或效果

眼睛疲劳、眼病预防（游泳后、灰尘或汗液进入眼睛时等）、因紫外线等光线引发的眼炎（雪盲等）、眼险炎（眼险糜烂）、佩戴硬性隐形眼镜时的不适感、眼睛发痒、视线模糊（眼眵较多时等）

用法及用量

请按1天3~6次，1次2~3滴点眼。
请严格遵守规定的用法用量。
儿童使用时应在监护人指导监督下使用。
容器端部请勿触碰眼皮、睫毛。且，请勿使用混浊的产品。
请勿戴着软性隐形眼镜使用。
仅限作为滴眼药水使用。

成分及分量

Neostigmine methylsulfate 0.005%
Cyanocobalamin (Vitamin B12) 0.02%
Flavin adenine dinucleotide sodium 0.05%
Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 1%
Chondroitin Sulfate Sodium 0.5%

添加剂

l-Menthol, Dryobalanops aromatica resin, Eucalyptus oil, Chlorobutanol, Benzalkonium chloride, citric acid, Sodium citrate, Boric acid, pH adjusting agent, Edetate sodium, Isotonic agents, Polysorbate 80, Anhydrous ethanol

使用注意事项

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师治疗的人群
因药物等出现过过敏症状的人群
拥有以下症状的人群
眼睛剧烈疼痛
接受以下诊断的人群
青光眼
使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者
皮肤：
起疹、发红
发痒
眼睛：
充血
发痒
红肿
●下述情况时应中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
未改善视线模糊时。
使用2周左右后症状仍无改善时。

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射的阴凉场所密封保管。
请保管在儿童无法触及的地方。
请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质。）
请勿与其他人共用
请勿置于汽车的仪表板等高温下。（会发生容器变形或药液的质量劣化）
滴眼过程中如有药液溢出发生衣物等染色，请立即用水清洗
请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）
根据保存状态，成分的结晶可能会附着在容器的前端或盖子内侧。此时，请用干净的纱布等轻轻擦拭后使用。

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任