

## リポビタンDPRO

第二类医薬品  
ドリンク剤

## 効能・効果

肉体疲労・病中病後・栄養障害・発熱性消耗性疾患  
食欲不振  
妊娠授乳期などの場合の栄養補給  
滋養強壮  
虚弱体質

## 用法・用量

成人（15歳以上）1日1回1本（100mL）を服用してください。  
15才未満、服用しないこと  
定められた用法・用量を厳守してください。  
本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。  
よく振ってから服用してください。

## 成分及び分量

100mL中  
タウリン 1000mg  
ハゲキテン流エキス 0.2mL（巴戟天200mg）  
イノシトール 50mg  
ニコチン酸アミド 20mg  
チアミン硝化物 5mg  
リボフラビンリン酸エステルナトリウム 5mg  
ピリドキシン塩酸塩 5mg  
無水カフェイン 50mg

## 添加物

白糖,D-ソルビトール,精製ステビア抽出物,ポビドン,安息香酸ナトリウム,クエン酸,クエン酸Na,香料,グリセリン,アルコール,バニリン（アルコール0.2mL以下）

## 成分及び分量に関連する注意

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB2によるもので、ご心配ありません

## 使用上の注意

## 相談すること

服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
皮膚：  
発疹  
消化器：  
胃部不快感  
服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢  
しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない涼しい所に保管してください  
小児の手のとどかない所に保管してください。  
使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

31

## 【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。