

TAISHO KAMPO STOMACH MEDICINE <ORAL LIQUID>

第二類醫藥品
胃腸藥

療效或效果

飲酒過量、噁心（宿醉與酩酊大醉想吐、想吐、反胃、作嘔、噁心）、食慾不振、消化不良、胃部及腹部膨脹感、胃弱、進食過量、胸口灼熱、胃脹、胸悶、嘔吐

用法及用量

成人（15歲以上）1天3次1次1瓶，餐前或餐與餐之間服用。

餐與餐之間服用時，大約為餐後2~3小時。

請務必遵守規定用法、用量。

本劑含天然藥材成分，經過一段時間可能出現沉澱現象，但藥效並不受影響。請充分搖勻後再行服用。

成分及分量

1枝（30mL）中

Goreisanryo Dry Extract 0.3g 0.3g（equivalent to 0.833g of Alisma Tuber, 0.750g of Poria Sclerotium, 0.500g of Cinnamon Bark, 0.750g of Polyporus Sclerotium, 0.750g of Anractylodes Rhizome）

Orengedokuto Dry Extract 0.3g（equivalent to 0.333g of Coptis rhizome, 0.333g of Phellodendron bark, 0.333g of Gardenia fruit, 0.5g of Scutellaria root）

添加劑

Sugar, D-Sorbitol, citric acid, Sodium benzoate, Butyl parahydroxybenzoate, Polysorbate 80, Anhydrous ethanol, Other two-component

使用上的注意事項

諮詢事項

●下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
正在接受醫師治療的人。

服用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

腸繫膜靜脈硬化症：因長期服用，反覆出現腹痛、腹瀉、便秘、腹部膨脹等。

●即使用1個月左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

●長期連續服用的情況下，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿服用超過使用期限的產品。

本藥劑用量為每次1瓶，一經開封，請飲用完畢。請勿於開封的狀態下存放

51

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。