

# 大正胃腸薬バランスー

大正胃腸薬バランスーは、消化酵素が消化を助け、健胃生薬が胃腸機能を調節し、胃に留まる脂などによる消化不良・胃もたれを改善します。清涼感のあるスーとした服用感です。

## 効能・効果

消化不良、消化促進、胃もたれ、食べ過ぎ、飲み過ぎ、食欲不振（食欲減退）、胸やけ、胃痛、胃酸過多、胃部不快感、げっぷ、胃部・腹部膨満感、胃重、はきけ（胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、胸つかえ、嘔吐、胃弱

## 用法・用量

次の量を食間又は食後に水又はぬるま湯で服用してください。

成人(15才以上)、1回1包、1日3回

11才～14才、1回2/3包、1日3回

8才～10才、1回1/2包、1日3回

5才～7才、1回1/3包、1日3回

3才～4才、1回1/4包、1日3回

3才未満、服用しないこと

## 注意

定められた用法・用量を厳守してください。

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分及び分量

1包 (1.2g)中

ビオチンアスターゼ2000 30mg

プロザイム6 6.7mg

リパーゼAP6 30mg

ケヒ末 133.3mg

ショウキョウ末 15mg

ソウジュツ末 15mg

コウボク末 15mg

チンピ末 15mg

合成ヒドロタルサイト 300mg

炭酸水素ナトリウム 150mg

## 添加物

D-ソルビトール、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、l-メントール、香料、プロピレングリコール、カルメロース、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ポリソルベート80、タルク、二酸化ケイ素

## 使用上の注意

### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

- 次の人は服用しないでください  
透析療法を受けている人。
- 長期連用しないでください

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

医師の治療を受けている人。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

次の診断を受けた人。

腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

皮膚：発疹・発赤、かゆみ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、下痢

- 2週間位服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

小児の手の届かない所に保管してください。

他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)  
1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。  
使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

**【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】**

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。