

## コーラックII

◆コーラックIIは、DSS※が便に水分をふくませ適度に軟らかくし、ピサコジルが大腸を直接刺激して運動を活発にすることにより、便秘にしっかり効きます。■便通の具合を見ながら服用量を調節することができます。☒ジオクチルソジウムスルホサキシネート

## 効能・効果

1)便秘☒便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔口

## 用法・用量

次の量を就寝前（又は空腹時）に水又はぬるま湯で服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

1 5才以上、1回1～3錠、1日1回

1 1～1 4才、1回1～2錠、1日1回

1 1才未満、服用しないこと

定められた用法・用量を厳守してください。

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

制酸剤や牛乳をのんでから1時間以内の服用はさけてください。（本剤は制酸剤や牛乳によって胃内で溶解し、期待された効果を発揮できないことがあります）

錠剤をかんだり、つぶしたりせずにそのまま服用してください。（本剤は有効成分がその能力を十分に発揮し、大腸内で作用するよう特殊なコーティングをほどこしています）

錠剤の取り出し方

・図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

（誤ってシートのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

## 成分及び分量

3錠中

ピサコジル 15mg

ジオクチルソジウムスルホサキシネート(DSS) 24mg

## 添加物

乳糖,無水ケイ酸,ヒドロキシプロピルセルロース,ステアリン酸Mg,アラビアゴム,白糖,タルク,酸化チタン,メタクリル酸共重合体S,メタクリル酸共重合体L,ヒマシ油,赤色3号,マクロゴール,カルナウバロウ,サラシミツロウ

## 使用上の注意

## してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

●本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

他の瀉下薬（下剤）

●大量に服用しないこと

## 相談すること

●次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

医師の治療を受けている人。

妊婦又は妊娠していると思われる人。

次の症状のある人。

はげしい腹痛又は吐き気・嘔吐のある人。

●服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

消化器：

はげしい腹痛

吐き気

嘔吐

●服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

●1週間間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

小児の手のとどかない所に保管してください。

他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。