

◆COLAC II 所含DSS※成分提高糞便含水量，適度軟便；bisacodyl直接刺激大腸，幫助腸道蠕動，有效緩解便秘。☑可視排便狀態調整服用劑量。☒
Dioctyl sodium sulfosuccinate

療效或效果

1)便秘2)緩和伴隨便秘的下列症狀：頭重、上火、皮膚粗糙、粉刺、食欲不振（食欲減退）、腹部膨脹、腸內異常發酵、痔瘡

用法及用量

請於睡前(或空腹時)將以下用量用冷水或微溫水服用。不過，請於首次使用最少用量，然後視排便情況或狀態，再逐漸增量或減量。

1 5歲以上，1天1次，1次1~3片

1 1~1 4歲，1天1次，1次1~2片

未滿11歲者，請勿服用

請務必遵守規定用法、用量。

兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。

請避免於飲用制酸劑或牛奶後1個小時內服用。（本藥劑受制酸劑或牛奶於胃內溶解可能造成藥效無法發揮）

請直接吞服，避免將藥錠嚼碎或磨碎服用。（本藥劑外加可充分發揮藥效，於大腸發揮作用的特殊膜衣）

錠劑取出方法

●如圖所示，以指尖用力按壓藥錠PTP包裝凸出部位，使鋁箔背模破裂後取出藥錠服用。

（不慎誤食包裝將可能造成刺傷食道黏膜等意外事故發生）

成分及分量

3片中

Bisacodyl 15mg

Sodium dioctyl-sulfosuccinate 24mg

添加劑

Lactose ,anhydrous silicic acid ,Hydroxypropylcellulose,Magnesium stearate,Acacia ,Sugar,Talc,Titanium oxide,Methacrylic acid copolymer S,Methacrylic acid copolymer L,Castor oil ,Erythrosine,Macrogol ,Carnauba wax ,White beeswax

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

●服用本藥劑的期間，請勿服用下列醫藥品。

其他瀉下藥（瀉藥）

●請勿大量服用

諮詢事項

●下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

有下列症狀的人。

有劇烈腹痛或噁心·嘔吐的人。

●服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

消化器官：

劇烈腹痛

噁心

嘔吐

●服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

腹瀉

●即使服用1週左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿服用超過使用期限的產品。

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。