

# NEW ZENA F-II

第二類醫藥品  
含維生素保健藥

◆New Zena F- II 含巴西原產的天然強身藥材muirapuama、中國作為天然強身藥材使用的巴戟天、淫羊藿、自古以來便作為滋養強身之用的人參等多達14種的天然藥材（相等於原藥材4380mg）以及taurine、維生素配方的小包裝能量飲料。●適合工作上過於勉強而感到肉體疲勞者、罹患感冒等發熱性消耗性疾病、體力衰竭者等作為補充營養之用，效果優異。

## 療效或效果

身體疲勞、病中病後、營養障礙、發熱性消耗性疾患  
食欲不振  
懷孕哺乳期等的營養補充  
滋養強身  
虛弱體質

## 用法及用量

成人（15歲以上）1天1次1枝（50mL）服用。  
未滿15歲者，請勿服用  
請務必遵守規定用法、用量。  
本劑含天然藥材成分，如有沉澱屬正常現象，藥效並不受影響。  
請充分搖勻後再行服用。

## 成分及分量

50mL 中  
Muirapuama Extract-A 15mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)  
Morinda Officinalis Root Fluid Extract 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)  
Ginseng extractM 90mg (equivalent to 600 mg of the crude drug)  
Peony Root extract 30mg (equivalent to 120 mg of the crude drug)  
Rehmannia Root Extract-A 150mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)  
Japanese Angelica Root Fluid Extract 0.11mL (equivalent to 110 mg of the crude drug)  
Poria Sclerotium extract 9.6mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)  
Cinnamon Bark Fluid Extract 0.15mL (equivalent to 150 mg of the crude drug)  
Agkistrodon Meat and Bones Tinctures 1.75mL (equivalent to 350 mg of the crude drug)  
Cnidium Rhizome Fluid Extract 0.1mL (equivalent to 100 mg of the crude drug)  
Astragalus Root Fluid Extract 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)  
Glycyrrhiza Extract 37.5mg (equivalent to 150 mg of the crude drug)  
Atractylodes Rhizome extract 54.5mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)  
Epimedium Herb extract 100mg (equivalent to 1000 mg of the crude drug)  
Thiamine Nitrate 10mg  
Riboflavin sodium phosphate 5mg  
Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B6) 5mg  
Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 500mg  
Anhydrous caffeine 50mg

## 添加劑

Sugar, Xylitol, Trehalose, Glycerol fatty acid ester, Polyoxyethylene hydrogenated castor oil, Glycerin, Tricaprilin, Povidone, Sodium benzoate, pH adjusting agent, flavor, alcohol (not more than 1.0mL)

## 成分及分量相關的注意事項

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素B2的影響，無須擔憂

## 使用上的注意事項

### 諮詢事項

- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
皮膚：  
發疹  
消化器官：  
胃部不適感
- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
持續服用一段時間症狀仍未見改善時，請停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
腹瀉

## 保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射的陰涼處保管  
請置於兒童無法觸及之處保管。

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。