

◆ZENA KING活精是帮助您增强体力的滋养强壮迷你保健饮品。◆除了鹿茸、肉苁蓉、淫羊藿及巴西原产的滋养强壮生药Muirapuama以外，共使用了17种生药提取物（相当于6050mg的原生药），并配合了牛磺酸及维生素，是我公司独家配方。◆在您感到疲惫却还需要坚持努力，在需要增强体力等情况时很有效的营养补充方法。

效能或效果

- ☆滋补
- ☆虚弱体质
- ☆身体疲劳、发热性消耗性疾病、食欲不振、病中病后、营养障碍、怀孕哺乳期等时的营养补充

用法及用量

成年人（15岁以上），请按1天1次1支(50mL)服用。
未满15岁，不宜服用

〔注意〕

请严格遵守规定的用法用量。
本药剂含有生药成分，偶尔会出现沉淀，但是药效没有变化。
请摇匀后服用。

成分及分量

1支（50mL）中
 Antler Velvet Tinctures 1.08mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Cistanche Herb Extract 151.6mg (equivalent to 500 mg of the crude drug)
 Epimedium Herb extract 100mg (equivalent to 1000 mg of the crude drug)
 Acanthopanax Fluid Extract 0.3mL
 (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Tochukaso Fluid Extract 0.15mL (equivalent to 150 mg of the crude drug)
 Cnidii monnieri fructus extract 37.5 mg (equivalent to cnidii monnieri fructus 300 mg)
 Dodder Seed Extract 33mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Eucommia Bark Extraction Liquid 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Muira Puama Extract-A 15mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Ginseng extract-P 85.8mg (equivalent to 600 mg of the crude drug)
 Dioscorea Rhizome Fluid Extract 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Polygonum tincture 0.61 mL (equivalent to polygonum root 200 mg)
 Cornus Fruit Fluid Extract 0.5mL (equivalent to 500 mg of the crude drug)
 Poria Sclerotium extract 9.6mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Schisandra Fruit Fluid Extract 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Glycyrrhiza Extract 25mg (equivalent to 100 mg of the crude drug)
 Rehmannia Root Extract-A 150mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 500mg
 Riboflavin sodium phosphate 5mg
 Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B6) 5mg
 Anhydrous caffeine 50mg

添加剂

Sugar,Sodium benzoate,Butyl parahydroxybenzoate,Polyoxyethylene hydrogenated castor oil,Povidone ,citric acid,Sodium citrate,flavor,alcohol (not more than 1.16mL),Dextrin

〔注意〕

服用本药剂，可能会出现尿液变黄的情况，这是因本药剂中的维生素B2引起的现象，因此不用担心

使用注意事项

咨询事项

- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
 皮肤：
 起疹
 消化系统：
 胃部不适
- 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
 腹泻
- 若服用一段时间后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射的阴凉场所
请保管在儿童无法触及的地方。
请勿服用超过使用期限的产品。

11

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任