

◆ZENA KING活精是滋養強壯迷你保健飲品，支援想增強體力的你。◆本公司的獨家處方採用鹿茸、肉蓯蓉、淫羊藿及巴西原產滋養強壯生藥 Muirapuama，還配合了共17種生藥提取物（相等於6050mg原生藥材）、牛磺酸及維生素。◆即使感到疲勞仍想繼續努力，對於想增強體力的人，能非常有效地補充營養。

療效或效果

- ☆滋養強身
- ☆虛弱體質
- ☆身體疲勞、發熱性消耗性疾患、食欲不振、病中病後、營養障礙、懷孕哺乳期等的營養補充

用法及用量

成人（15歲以上）1天1次1枝（50mL）服用。
未滿15歲者，請勿服用

〔注意事項〕

請務必遵守規定用法、用量。
本劑含天然藥材成分，如有沉澱屬正常現象，藥效並不受影響。
請充分搖勻後再行服用。

成分及分量

1枝（50mL）中
 Antler Velvet Tinctures 1.08mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Cistanche Herb Extract 151.6mg (equivalent to 500 mg of the crude drug)
 Epimedium Herb extract 100mg (equivalent to 1000 mg of the crude drug)
 Acanthopanax Fluid Extract 0.3mL
 (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Tochukaso Fluid Extract 0.15mL (equivalent to 150 mg of the crude drug)
 Cnidii monnieri fructus extract 37.5 mg (equivalent to cnidii monnieri fructus 300 mg)
 Dodder Seed Extract 33mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Eucommia Bark Extraction Liquid 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Muira Puama Extract-A 15mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Ginseng extract-P 85.8mg (equivalent to 600 mg of the crude drug)
 Dioscorea Rhizome Fluid Extract 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Polygonum tincture 0.61 mL (equivalent to polygonum root 200 mg)
 Cornus Fruit Fluid Extract 0.5mL (equivalent to 500 mg of the crude drug)
 Poria Sclerotium extract 9.6mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Schisandra Fruit Fluid Extract 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Glycyrrhiza Extract 25mg (equivalent to 100 mg of the crude drug)
 Rehmannia Root Extract-A 150mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
 Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 500mg
 Riboflavin sodium phosphate 5mg
 Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B6) 5mg
 Anhydrous caffeine 50mg

添加劑

Sugar, Sodium benzoate, Butyl parahydroxybenzoate, Polyoxyethylene hydrogenated castor oil, Povidone, citric acid, Sodium citrate, flavor, alcohol (not more than 1.16mL), Dextrin

〔注意事項〕

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素B2的影響，無須擔憂

使用上的注意事項

諮詢事項

- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：
發疹
消化器官：
胃部不適感
- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
腹瀉
- 即使服用一陣子，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射的陰涼處保管
請置於兒童無法觸及之處保管。
請勿服用超過使用期限的產品。

11

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。