

◆NARON Loxy是1次1錠迅速溶解的錠劑，能迅速舒緩疼痛。◆解熱鎮痛成分洛索洛芬鈉能抑制引起疼痛及發熱的物質前列腺素，能發揮優越的止痛功效。◆成分於體內被吸收後才變得活躍及發揮功效，減少胃部負擔。◆不含令人有睡意的成分。

## 療效或效果

◆頭痛、牙痛、拔牙後的疼痛、咽喉痛、耳朵痛、關節痛、神經痛、腰痛、肌肉疼痛、肩膀痠痛、撞傷痛、骨折痛、扭傷痛、月經痛(生理痛)、外傷痛的鎮痛◆惡寒、發燒時的解熱

## 用法及用量

症狀出現時，請用冷水或微溫水服用以下用量，並盡量避免於空腹時服用：

成人（15歲以上），1天最多1次，1次2片

\*不過，若症狀再次出現，可服用第3次。

每次服用請間隔4個小時以上。

未滿15歲者，請勿服用

## 〔注意事項〕

請務必遵守規定用法、用量。

錠劑取出方法

●如圖所示，以指尖用力按壓藥錠PTP包裝凸出部位，使鋁箔背模破裂後取出藥錠服用。

（不慎誤食包裝將可能造成刺傷食道黏膜等意外事故發生）

## 成分及分量

1片中

Loxoprofen sodium hydrate 68.1 mg (60 mg as anhydride)

## 添加劑

二氧化矽

D-甘露醇

羥丙基纖維素

交聯聚維酮

醋磺內酯鉀

三氯蔗糖

檸檬油

食用黃色五號

硬脂酸鎂

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

●符合下列情形者請勿服用

曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。

曾因服用本藥劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥而引起氣喘者

未滿15歲的兒童

正在醫療機構接受下列治療的人。

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、肝臟病、腎臟病、心臟病、被醫師指出有紅血球數量低（貧血）、血小板數量低（難以止血、容易出血）、白血球數量低等血液異常（血液疾病）的人。

預產期12週以內的孕婦

●服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。

其他解熱鎮痛藥、感冒藥、鎮靜藥

●服用前後請勿飲酒

●請勿持續長期服用

（即使服用3~5日，仍反覆出現疼痛等症狀，請停止服用，接受醫師診治）

### 諮詢事項

●下列的人於服用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師或牙科醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

正在哺乳的人。

年長者。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

接受過下列診斷的人。

支氣管哮喘

潰瘍性大腸炎

克隆氏症  
全身性紅斑性狼瘡  
混合性結締組織病  
曾罹患下列疾病的人。  
胃潰瘍、十二指腸潰瘍  
肝臟病  
腎臟病  
血液疾病

●服用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止服用並攜帶本文件諮詢醫生或藥劑師  
・服用如本藥劑的解熱鎮痛藥後，引發體溫過低、虛脫（乏力）、四肢冰冷（手腳冰冷）等症狀時。  
・服用後，如出現消化性潰瘍、浮腫時。另外，在極少可能引發消化道出血（出現吐血、噁心、嘔吐、腹痛、黑色焦油狀大便、血便等）、消化道穿孔（消化道有孔。出現噁心、嘔吐、劇烈腹痛等）、小腸及大腸的狹窄與阻塞（出現噁心、嘔吐、腹痛、腹部膨脹等）的嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

服用後，出現以下症狀時

皮膚：發疹、發紅發癢

消化器官：腹痛、胃部不適感、食欲不振、噁心、嘔吐、腹部膨脹、胸口灼熱、口腔潰瘍、消化不良

精神神經系統：嗜睡、發麻、頭暈、頭痛

循環器官：血壓上升、心悸

其他：胸痛、倦怠感、臉部發燙、發熱、貧血、血尿

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

休克（過敏性）：服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

血液功能障礙：出現喉嚨痛、發熱、全身倦怠、臉部及眼瞼裏面看起來蒼白、容易出血（牙齦出血、流鼻血等）、出現瘀青（按壓亦不會褪色）等。

皮膚黏膜眼綜合征（史蒂芬強森症候群）、中毒性表皮壞死松解症：發高燒、眼睛充血、眼屎、口唇糜爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅等持續，或者突然惡化。

腎功能障礙：出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛（各關節疼痛）、腹瀉等。

鬱血性心臟衰竭：出現全身倦怠、心悸、氣短、胸部不適感、胸痛、頭暈、昏厥等。

間質性肺炎：爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短・呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。

肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

橫紋肌融解症：手腳、肩膀・腰等的肌肉疼痛、手腳痠麻、無力、僵硬、全身倦怠、紅褐色尿等。

無菌性腦膜炎：出現伴隨脖子抽筋的劇烈頭痛、發燒、噁心・嘔吐等。（尤其是接受全身性紅斑性狼瘡或混合性結締組織病治療的人當中，許多人自訴這種症狀。）

氣喘：呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。

●服用後可能出現下列症狀，如該症狀持續或加重時，請停止服用並攜帶本文件諮詢醫生或藥劑師

腹瀉、便秘、口乾

即使服用1~2次，症狀也沒有改善的情況下（有可能患上其他疾患），請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師

## 保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿服用超過使用期限的產品。

此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於6個月內使用完畢。（為確保品質）

11

### 【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

・本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。

・多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。

・多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。

・关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。